

MONITOREO DE RESULTADOS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE VIH

BANCO DE PREGUNTAS



*"Su fuente de preguntas para medir
los resultados y objetivos de sus intervenciones
para la prevención de VIH"*

ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Página
Introducción al Banco de Preguntas (BP)	3
Preguntas sobre conductas de riesgo	13
➤ Comportamiento Sexual	14
➤ Uso de Sustancias	28
Preguntas sobre los Factores que Influyen la Conducta (FIBs):	
➤ Valoración del Riesgo	37
➤ Auto-percepciones	45
➤ Emoción y Excitación	59
➤ Cuestiones de la relación e influencia social	62
➤ Factores Estructurales y Ambientales	82
Preguntas sobre las Etapas de Cambio	88
Preguntas sobre el Conocimiento	93
Apéndice A	98
Apéndice B: Muestras de encuestas	104
Fuentes	119

Introducción

¿Qué es el Banco de Preguntas

El Banco de Preguntas (BP) es una colección de puntos para encuesta que pueden ser usados con miras a crear un cuestionario. Un cuestionario es una herramienta que permite recabar información acerca de un cliente o programa. Es probable que le interese administrar un cuestionario a los clientes que participen en sus intervenciones para la prevención de VIH. Un cuestionario es administrado generalmente justo antes de la intervención, y al menos una vez después de ésta. La información puede ser utilizada para detectar cambios en los conocimientos, actitudes, habilidades o conducta de un cliente, y esta información puede ayudarle a determinar si su intervención logró sus objetivos.

El BP contiene preguntas que sirven para recopilar información sobre una variedad de temas. Hay preguntas sobre el comportamiento sexual y el uso de sustancias del cliente. Existen también preguntas que le ayudan a ubicar en etapas el progreso del cliente respecto a un cambio conductual en particular, así como ejemplo de cuestionarios que han sido empleados por organizaciones en otros estados y jurisdicciones.

La sección más extensa del BP contiene preguntas sobre los factores que influyen la conducta (FIBs). Los FIBs explican porqué los miembros de una población meta incurrir en conductas riesgosas. Las intervenciones que usted ejecute deben abarcar actividades que atiendan a los factores que explican la conducta riesgosa de sus clientes. Por ejemplo, si un cliente practica el sexo inseguro debido a que no sabe cómo negociar el uso del condón con su pareja, la intervención que usted realice debe incluir actividades que desarrollen las habilidades de comunicación y negociación para el uso del condón. Las preguntas en la sección correspondiente a los FIBs del BP puede ayudarle a determinar si el cliente adquirió o no la habilidad después de participar en la intervención.

El BP no constituye un manual de procedimientos o evaluación. El mismo no le indica cómo implementar o evaluar una intervención. Tan sólo le proporciona a usted los puntos de encuesta a fin de que pueda crear cuestionarios para aprender ´ más acerca de sus clientes y las intervenciones. Para mayor información sobre herramientas adicionales de recopilación y análisis de la información, o sobre el uso de la información en la planificación, refiérase a los Módulos 2 y 4 de la serie "Monitoreo de Resultados de Programas de Prevención de VIH."

¿Por qué usar el Banco de Preguntas?

La creación de un instrumento de encuesta científicamente válido puede traducirse en todo un desafío. El BP le ahorra mucho tiempo y esfuerzos innecesarios al proporcionarle a usted preguntas que han sido desarrolladas y probadas por investigadores y evaluadores profesionales. El BP también le brinda la flexibilidad suficiente para que desarrolle sus propias herramientas de recopilación de información, con miras a que éstas reflejen las necesidades únicas de sus clientes, intervenciones u organización. Puede seleccionar usted mismo los puntos (contenido) que desee incluir y decidir sobre la presentación y extensión (formato) de la encuesta.

¿Cómo Usar el Banco de Preguntas

El proceso de desarrollar un cuestionario es cubierto en el Módulo 2 de la serie "Monitoreo de Resultados de Programas de Prevención de VIH." El BP no abarca este tema. Por favor consulte el Módulo 2 si tienen preguntas relacionadas con el desarrollo de un cuestionario. Asimismo, usted tiene que definir primero los resultados de sus intervenciones antes de seleccionar las preguntas para poder medirlos Si requiere ayuda para la definición de sus resultados, consulte también el Módulo 2.

Otro recurso útil para la planeación y el desarrollo de una encuesta es la Guía para la Valoración Basada en la Comunidad, la cual fue diseñada para enseñar a la gente que trabaja en la prevención del VIH cómo recabar información de manera sistemática La guía completa se encuentra disponible por Internet a través del sitio del Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern en Dallas, bajo la sección Caja de Herramientas para la Prevención del VIH, ubicada en:
<http://www.utsouthwestern.edu/preventiontoolbox>

Los componentes que integran el BP son puntos de medición de resultados adecuados para las intervenciones comunitarias-, a nivel individual y grupal, la gestión de casos para la prevención, y los servicios de orientación, de prueba, y de canalización. Las preguntas están agrupadas en las siguientes categorías: Factores que influyen la conducta (FIBs); Etapas del Cambio; Conocimientos; y Conductas de Riesgo. Hay un par de categorías con secciones especiales para adolescentes, aunque algunas de estas preguntas también pueden ser apropiadas para otras poblaciones.

Existen diversas maneras en las que las preguntas pueden ser planteadas a sus clientes. Para su comodidad, hemos quitado las respuestas de las preguntas o afirmaciones a fin de que usted pueda decidir sobre la mejor manera de presentar la pregunta a su audiencia. Los siguientes son algunos ejemplos de distintos tipos de preguntas y sus posibles respuestas.

<u>Tipo de Pregunta</u>	<u>Ejemplo:</u>
➤ Cierto/Falso	Una persona que ésta infectada con VIH puede verse y sentirse bien. _____ Cierto _____ Falso _____ No sé
➤ Si/No	¿Alguna vez se ha sometido a la prueba de VIH/SIDA? _____ Si _____ No
➤ Llene el espacio en blanco	El coito anal ocurre cuando un hombre inserta su pene en el _____ de un hombre o una mujer.

<p>➤ Escalas</p> <p><i>Nota: Las escalas son una forma de medir cómo se siente la gente respecto a algo, en contraposición a las preguntas de si/no.</i></p>	<p>¿Cuáles son sus probabilidades de contraer SIDA durante los próximos 12 meses?</p> <p>1 Extremadamente probable 2 Muy probable 3 Poco probable 4 Casi nada probable 5 Para nada 6 Sin opinión</p> <p>En lo absoluto Cosa segura</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>Tot. en Desacuerdo En Desacuerdo De acuerdo Tot. de Acuerdo</p>
<p>➤ Indicadores de frecuencia</p>	<p>¿Cuántas veces ha tenido usted coito anal activo en los últimos dos meses?</p> <p>_____ número de veces</p>
<p>➤ Preguntas abiertas</p>	<p>¿Cuáles son las razones por las que usted no limpia siempre sus agujas con desinfectante al compartirlas?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>➤ Preguntas de opción múltiple</p>	<p>El número de mujeres diagnosticadas con SIDA en los Estado Unidos en 1994 fue aproximadamente de:</p> <p>a) 5,000 b) 10,000 c) 14,000 d) 35,000 e) 50,000</p>

Si requiere orientación para la selección adecuada de respuestas a las preguntas que usted elija, consulte los códigos de las opciones de respuesta que aparecen enseguida del número fuente después de cada pregunta. Refiérase a la clave que aparece abajo para ver una explicación de los códigos. Para conocer ejemplos detallados de preguntas que utilizan cada una de estas opciones de respuesta, consulte nuevamente la tabla que se muestra arriba.

CLAVE DE OPCIÓN DE RESPUESTA	
Opción de Respuesta	Código de Respuesta
Cierto/Falso	C/F
Si/No	S/N
Llene el espacio en blanco	FB
Escala	S
Indicadores de frecuencia	FI
Preguntas Abiertas	OE
Preguntas de Opción Múltiple	MC

Recuerde, no obstante, que estas opciones de respuesta sólo son pertinentes a la pregunta o afirmación tal y como aparece en el BP. Si usted modifica la pregunta de cualquier forma, las opciones de respuesta quizás ya no sean los tipos apropiados de respuestas. Conforme vaya seleccionando las preguntas y decida sobre las opciones de respuesta, tenga presente el significado que tendrán las respuestas para usted. ¿Qué está tratando de averiguar? ¿Qué está intentando cambiar con su intervención?

Conforme elija las preguntas o afirmaciones que quiere incluir en su instrumento de encuesta, procure tener presente cómo le gustaría presentar las mismas a sus encuestados. Haga lo posible por incluir diferentes tipos de preguntas, y asegúrese de tener en cuenta el nivel de lectura de su población meta. Asimismo, no es necesario que utilice todas las preguntas de un grupo en particular. Use solamente aquellas que sean pertinentes para su intervención, evitando preguntas repetitivas o preguntas que planteen la misma interrogante una y otra vez. La *guía para la Valoración Basada en la Comunidad* (págs. 60-62) proporciona lineamientos sobre cómo formular las preguntas correctas. Existen también maneras de hacer un muestreo entre los miembros de la comunidad para intervenciones a nivel comunitario (CLI) Para mayor información, por favor consulte la sección sobre entrevistas en micrositios (págs. 71-72) de la guía para la *Valoración Basada en la Comunidad*.

Factores que influyen la conducta (FIBs)

Los FIBs explican las razones por las que los miembros de una población meta incurren en conductas riesgosas. La mayoría de ustedes medirán al menos un FIB como un resultado inmediato en la intervención que implementen. Usted debe haber identificado éstos ya en un modelo lógico u otro tipo de plan de acción de su intervención. Como repaso, y para aquellos de ustedes que no estén tan familiarizados con los factores de influencia, se incluye aquí una tabla que contiene una lista de FIBs con definiciones y ejemplos breves. Los ejemplos son presentados como en forma de afirmaciones que los clientes pudieran hacer; las afirmaciones revelan el factor de influencia.

Estos son los factores de influencia que más probablemente encontrará en sus poblaciones meta e intervenciones, aunque puede haber otros FIBs que expliquen la conducta riesgosas y que no vengan listados abajo. Para más información acerca de los FIBs, también puede visitar el sitio web de la universidad UT Southwestern en: <http://www.utsouthwestern.edu/preventiontoolbox>

FIB	Definición y Ejemplo
Comunicación y Negociación	<p><u>Definición:</u> niveles de comodidad y habilidades asociadas a hablar con la pareja acerca de las prácticas sexuales, el uso del condón, el consumo de drogas, o la revelación de la condición VIH</p> <p><u>Ejemplo:</u> "Yo traigo conmigo un condón, aunque no sé realmente cómo mencionar el hecho o en qué momento sacarlo."</p>
Normas Culturales	<p><u>Definición:</u> las ideas acerca de lo que es o no es considerado como aceptable o conducta normal para hombres y mujeres en torno a la sexualidad y la toma de decisiones; pueden involucrar ideas y prácticas familiares y religiosas.</p> <p><u>Ejemplo:</u> "No hay nada que pueda decir o hacer respecto a sus otras mujeres. Así son las cosas."</p>
Barreras ambientales o facilitadores	<p><u>Definición:</u> la carencia de bienes y servicios que pudieran permitir o facilitar que una persona reduzca su conducta riesgosa, o las políticas públicas y leyes que fomentan o desalientan las conductas riesgosas</p> <p><u>Ejemplo:</u> "No pude conseguir una aguja porque la farmacia que las vende estaba cerrada."</p>
Fatalismo	<p><u>Definición:</u> la convicción de que las circunstancias están fuera del control de uno</p> <p><u>Ejemplo:</u> "Si te vas a contagiar no hay nada que hacer, es el destino. ¿Para qué te preocupas?"</p>

<p>Normas de grupo</p>	<p><u>Definición:</u> actitudes y conductas individuales que influyen las actitudes y conductas de los miembros en el mismo grupo de iguales</p> <p><u>Ejemplo:</u> "Todos las personas que conozco fuman o beben un poco y terminan teniendo sexo."</p>
<p>Intenciones</p>	<p><u>Definición:</u> un plan para llevar a cabo una conducta específica</p> <p><u>Ejemplo:</u> "Voy a comprar condones la próxima vez que vaya a la tienda y se los mostraré a mi novio."</p>
<p>Dinámicas de poder interpersonales: coacción, sexo por drogas</p>	<p><u>Definición:</u> en las parejas, es la incapacidad para discutir o iniciar un cambio tendiente a reducir la conducta riesgosa debido a una falta de confort o una desigualdad en el poder; las desigualdades pueden resultar en sexo forzado o en un intercambio de sexo por otras mercancías, tales como drogas, comida, etc.</p> <p><u>Ejemplo:</u> "Si le pidiera que usara un condón seguramente él me lastimaría."</p>
<p>Gravedad percibida</p>	<p><u>Definición:</u> la creencia de que el VIH/SIDA no representa una gran amenaza debido a los avances en los tratamientos disponibles; la convicción de que la amenaza de contagio es un resultado menos grave que el no poder participar en conductas riesgosas</p> <p><u>Ejemplo:</u> "Si yo contraigo algo, simplemente tendré que ir a la clínica a que me pongan una inyección. Además, conozco gente seropositiva que se ve normal."</p>

<p>Susceptibilidad percibida</p>	<p><u>Definición:</u> la convicción personal de que uno no está en riesgo, por lo que es aceptable participar en conductas de alto riesgo</p> <p><u>Ejemplo:</u> "Yo no soy homosexual, así que no me preocupa contagiarme de SIDA."</p>
<p>Jerarquía de los problemas</p>	<p><u>Definición:</u> las necesidades imperiosas de una persona (vivienda, comida, hijos, un trabajo, etc.) que la obligan a relegar a un segundo plano su preocupación por el VIH/SIDA</p> <p><u>Ejemplo:</u> "Que importan los condones. Yo lo que necesito es un trabajo."</p>
<p>Auto-eficacia</p>	<p><u>Definición:</u> el grado de confianza que tiene una persona respecto a ser capaz de desempeñar una conducta específica</p> <p><u>Ejemplo:</u> "No me que pueda ser tan cuidadoso todas las veces."</p>
<p>Autoestima</p>	<p><u>Definición:</u> la percepción que tiene la persona de ser querida y/o valorada a pesar de sus imperfecciones</p> <p><u>Ejemplo:</u> "Yo tengo relaciones sexuales porque me hacen sentir más adulto(a)."</p>
<p>Excitación sexual</p>	<p><u>Definición:</u> la capacidad para evitar conductas riesgosas en condiciones de excitación sexual</p> <p><u>Ejemplo:</u> "Mi sentido del placer se guía por el momento. No hay planeación de por medio."</p>

Vergüenza y culpa	<p><u>Definición:</u> emociones que usualmente son producto de los estigmas asociados a la sexualidad que pueden detonar conductas sexuales de alto riesgo</p> <p><u>Ejemplo:</u> "La gente piensa que soy muy joven para tener sexo, entonces ¿a quién puedo pedirle condones?"</p>
-------------------	--

Fuentes

Las preguntas provienen de una variedad de más de 30 fuentes. Cada pregunta es seguida por un número que aparece entre paréntesis, el cual corresponde al número de la fuente que fue tomada. Esto le permitirá a usted referirse de vuelta a la fuente original en caso de que tenga dudas acerca de cómo fue usada la pregunta original o para revisar el instrumento de encuesta completo. No todas las fuentes han sido incluidas en la sección de Muestras (ver Apéndice B, pág. 104), pero usted puede referirse a la sección de Fuentes para más información sobre dónde obtener un instrumento de encuesta en concreto.

Conductas de Riesgo

Esta sección contiene preguntas y afirmaciones que pueden ser usadas para valorar las conductas de riesgo de los participantes del programa. Las respuestas a estas preguntas pueden ofrecer información detallada sobre el historial sexual y de uso de sustancias de sus clientes. Sin embargo, las secciones que siguen (FIBs, Etapas del Cambio y Conocimientos) pueden resultar más útiles para medir los resultados de sus intervenciones.



Comportamiento sexual

Parejas principales

1. ¿Ha cambiado de pareja sexual durante los últimos 6 meses? (18) [S/N]
2. ¿Participa usted de momento en actividades sexuales con cualquier persona? (18) [S/N]
3. ¿Está casado(a) o mantiene una relación íntima con alguien en la actualidad? (18) [S/N]
4. De las personas con las que ha tenido sexo durante los últimos 12 meses, hay alguien a quien usted considere como su pareja sexual más importante (o primaria)? (3) [S/N]
5. Si tiene novio o novia en este momento, ¿cuánto tiempo lleva viéndolo(a)? (7) [MC, FB]
6. Desde que se involucró en esta relación, ¿ha participado usted en actividades sexuales con otras parejas? (4) [S/N]

Número de parejas:

7. Durante el último año, ¿con cuántos(as) hombres/mujeres (excluyendo a su pareja principal si es que la tiene) ha tenido contacto sexual? (1) [MC, FI]
8. En los últimos doce meses, ¿con cuántas personas distintas (que no sean su pareja principal) ha tenido coito vaginal? (4) [MC, FI]
9. Durante los últimos doce meses, ¿con cuántas personas distintas (que no sean su pareja principal) ha tenido coito anal? (4) [MC, FI]
10. ¿Cuál es el número total de contactos sexuales casuales que ha tenido con hombres en los últimos doce meses? (1) [FI]

11. En los últimos doce meses, ¿cuántos de los hombres con los que tuvo relaciones sexuales fueron aventuras de una noche o encuentros aislados de una sola vez? (14) [MC, FI]
12. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido en los últimos doce meses? (3) [MC, FI]

13. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
¿Cuántas parejas sexuales hombres/mujeres ha tenido en los últimos 6 meses?	Desde el último programa/contacto, ¿cuántas parejas sexuales hombres/mujeres ha tenido?

(21) [MC, FI]

14. En los últimos 12 meses, ¿con cuántas mujeres diferentes (que no sean su pareja principal) ha tenido coito vaginal? (5) [FI, MC]
15. En los últimos 12 meses, ¿con cuántas mujeres diferentes (que no sean su pareja principal) ha tenido coito anal? (5) [FI, MC]
16. En total, ¿con cuántos hombres ha tenido sexo durante los últimos 12 meses? (8) [FI, MC]
17. En los últimos doce meses, ¿cuántos de los hombres con los que tuvo relaciones sexuales fueron aventuras de una noche o encuentros aislados de una sola vez? (14) [FI, MC]
18. Durante los dos meses pasados, ¿con cuántas personas tuvo relaciones sexuales? (7) [FI, MC]

19. Por favor indique con cuántos hombres, que no sean su pareja principal, ha realizado alguna de las siguientes actividades en los últimos 12 meses. (14) [FI, MC]
- a. Tuvo sexo anal receptivo con un hombre que usó condón
 - b. Participó en prácticas sexuales sadomasoquistas
 - c. Utilizó juguetes sexuales, tales como un dildo o un vibrador
 - d. Le amarró las muñecas o se dejó usted amarrárselas
 - e. Lamió/chupó a su pareja o se dejó lamer/chupar por ésta
 - f. Practicó sexo anal penetrativo usando un condón
 - g. Practicó sexo anal penetrativo sin usar un condón con eyaculación dentro de él
 - h. Tuvo sexo anal receptivo sin usar un condón con eyaculación dentro de usted
 - i. Tuvo sexo anal receptivo sin usar un condón con retiro antes de la eyaculación
 - j. Recibió sexo oral usando un condón
 - k. Recibió sexo oral y eyaculó en la boca de él sin usar un condón
 - l. Recibió sexo oral (tuvo su pene dentro de la boca de él) sin usar un condón, y con retiro del miembro antes de la eyaculación
 - m. Proporcionó sexo oral, usando el otro un condón
 - n. Proporcionó sexo oral, eyaculando el otro en su boca sin usar un condón
 - o. Proporcionó sexo oral (el otro tuvo el pene dentro de su boca) sin usar un condón, y con retiro del miembro antes de la eyaculación

Historial sexual de parejas:

20. Hasta donde usted sabe, durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido su pareja principal relaciones sexuales con otras parejas? (3) [S/N]
21. Hasta donde usted sabe, antes o durante su relación, ¿tuvo su pareja principal sexo con un(a) prostituto(a)? (1) [S/N]
22. Por favor indique cuántas veces durante el último año, y en los últimos 30 días, ha tenido usted encuentros sexuales con parejas casuales que se inyectaban drogas no recetadas. (1) [FI, MC]
23. Por favor indique cuántas veces durante el último año, y en los últimos 30 días, ha mantenido usted encuentros sexuales con parejas casuales masculinas que tuvieron sexo con prostitutas(as). (1) [FI, MC]
24. Por favor indique cuántas veces durante el último año, y en los últimos 30 días, ha mantenido usted encuentros sexuales con parejas casuales masculinas que tuvieron sexo con otros hombres. (1) [FI, MC]

Actividad sexual:

25. No estoy sexualmente activo por ahora debido a: (18) [OE, MC]
26. ¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales? (7) [S/N]
27. ¿A qué edad tuvo su primer contacto sexual-coito oral, anal, o vaginal-con otra persona? (4) [FB, MC]
28. Tener relaciones sexuales representó una parte importante de su vida este mes? (18) [S/N]
29. En general, ¿se sentía usted muy cansado para tener relaciones sexuales? (18) [S/N]
30. ¿Tuvo deseos de tener relaciones sexuales con su(s) pareja(s) este mes? (18) [S/N]

31. ¿Disfrutó usted de la actividad sexual este mes? (18) [S/N]
32. En general, ¿se sintió satisfecho después de la actividad sexual este mes? (18) [S/N]
33. ¿Ha tenido contacto sexual, ya sea coito vaginal, anal u oral, en los últimos 12 meses? (5) [S/N]
34. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que tuvo relaciones sexuales con alguien por primera vez (si es que las ha tenido)? (7) [FI, MC]

35. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido relaciones sexuales con alguien?	Desde el último programa/contacto, ¿ha tenido relaciones sexuales con alguien?

(10) [S/N]

Frecuencia de la actividad sexual:

36. Durante los 2 meses pasados, ¿con qué frecuencia se negó a tener relaciones sexuales cuando alguien se lo pidió? (7) [FI, MC]
37. ¿Cuál es el número total de contactos sexuales casuales que ha tenido con hombres en los últimos doce meses? (1) [FB]
38. ¿Qué tan seguido tuvo actividad sexual este mes? (18) [FI, MC]
39. ¿Cómo se compara este nivel de actividad sexual con su nivel habitual? (18) [OE, MC]
40. ¿Se sintió satisfecho con la frecuencia de su actividad sexual este mes? (18) [S/N, MC]
41. ¿Cuántas veces durante los últimos 12 meses ha participado en alguna de las siguientes actividades con su pareja principal: (5) [FI, MC]
- Coito vaginal
 - Su pareja le proporcionó sexo oral
 - Usted le proporcionó sexo oral a su pareja
 - Coito Anal

42. ¿Cuántas veces durante los últimos 30 días ha hecho cualquiera de las siguientes cosas con una mujer (excluyendo a su pareja principal)? (1) [FI, MC]
- Coito vaginal usando un condón
 - Coito anal sin usar un condón
 - Coito anal usando un condón
 - Coito Vaginal sin usar un condón
43. ¿Ha mantenido relaciones sexuales al menos una vez durante los últimos 12 meses, es decir desde este mes de este año? (8) [S/N]
44. ¿Ha tenido relaciones sexuales al menos una vez durante los últimos 5 años? (8) [S/N]
45. Por favor indique también cuántas veces durante los últimos 12 meses ha participado en las siguientes actividades con personas distintas a su pareja principal. (14) [FI, MC]
- Tuvo sexo anal receptivo con un hombre que usó condón
 - Participó en prácticas sexuales sadomasoquistas
 - Utilizó juguetes sexuales, tales como un dildo o un vibrador
 - Le amarró las muñecas o se dejó usted amarrárselas
 - Lamió/chupó a su pareja o se dejó lamer/chupar por ésta
 - Practicó sexo anal penetrativo usando un condón
 - Practicó sexo anal penetrativo sin usar un condón, con eyaculación dentro de él
 - Tuvo sexo anal receptivo sin usar un condón con eyaculación dentro de usted
 - Tuvo sexo anal receptivo sin usar un condón con retiro antes de la eyaculación
 - Recibió sexo oral usando un condón
 - Recibió sexo oral y eyaculó en la boca de él, sin usar un condón
 - Recibió sexo oral (tuvo su pene dentro de la boca de él) sin usar un condón, y con retiro del miembro antes de la eyaculación

- m. Proporcionó sexo oral, usando el otro un condón
- n. Proporcionó sexo oral, eyaculando el otro en su boca, sin usar un condón
- o. Proporcionó sexo oral (el otro tuvo el pene dentro de su boca) sin usar un condón, y con retiro del miembro antes de la eyaculación

46. Para cada una de las siguientes actividades, por favor indique cuántas veces en los últimos 30 días ha realizado cada una con un hombre (excluyendo a su pareja principal): (1) [FI, MC]

- a. Coito Anal-Oral (con lamidas/chupadas)
- b. Sexo oral sin la ingestión de semen
- c. Coito anal sin usar un condón
- d. Sexo oral con la ingestión de semen
- e. Coito anal sin usar un condón y con climax

47. Para cada una de las siguientes actividades, por favor indique cuántas veces en los últimos 30 días ha realizado cada una con parejas casuales (excluyendo a su pareja principal): (1) [FI, MC]

- a. Coito vaginal usando un condón
- b. Coito anal sin usar un condón
- c. Coito anal usando un condón
- d. Coito Vaginal sin usar un condón

Tipo de actividad sexual:

48. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido relaciones sexuales sólo con hombres, sólo con mujeres, o con ambos?	Desde el último programa/contacto, ¿ha mantenido relaciones sexuales sólo con hombres, sólo con mujeres, o con ambos?
¿Es su pareja sexual principal hombre o mujer?	Desde el último programa/contacto, ¿es su pareja sexual principal hombre o mujer?

(10) [FB, MC]

49. ¿Ha proporcionado alguna vez sexo oral a una pareja? (4) [S/N]
50. ¿Le ha proporcionado alguien sexo oral en alguna ocasión? (4) [S/N]
51. ¿Ha tenido alguna vez coito vaginal? (4) [S/N]
52. ¿Ha tenido alguna vez coito anal? (3) [S/N]
53. ¿Ha sostenido alguna vez relaciones sexuales en grupo, es decir sexo con más de una persona al mismo tiempo? (3) [S/N]
54. ¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales con una persona a al que le pagó o quien le pagó a usted? (3) [S/N]
55. Por favor indique en qué actividades han participado usted y su pareja durante su relación. (4) [FB, MC]

56. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
La última ocasión en que tuvo sexo con su pareja principal, ¿qué tipo de relaciones sexuales fueron?	Desde el último programa/contacto, ¿cuándo fue la ocasión más reciente en que tuvo sexo con su pareja principal, y qué tipo de relaciones sexuales sostuvieron?

(10) [FB, MC]

57. En los últimos 12 meses, ¿tuvo usted relaciones sexuales con una pareja casual en un lugar público, como podría ser una librería, un parque, un club, o unos baños? (13) [FB, MC]
58. En los últimos 12 meses, ¿tuvo usted relaciones sexuales con parejas casuales en situaciones de grupo con dos o más personas? (13) [S/N]

59. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
La última ocasión en que tuvo relaciones sexuales con alguien que no era su pareja principal, ¿qué tipo de sexo tuvieron?	Desde el último programa/contacto, la ocasión más reciente en que tuvo relaciones sexuales con alguien que no era su pareja principal, ¿qué tipo de sexo tuvieron?

(10) [FB, MC]

Uso del condón con la(s) pareja(s) principal(es):

60. Al sostener relaciones sexuales con su esposo o pareja estable en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usaron condones? (8) [FI, MC]
61. Al tener coito vaginal con su pareja principal durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usaron condones? (3) [FI, MC]
62. La ocasión más reciente en que tuvo coito vaginal con su pareja principal, ¿usó usted un condón? (3) [S/N]
63. La ocasión más reciente en que tuvo coito anal con su pareja principal, ¿usó usted un condón? (3) [S/N]
64. Al tener coito anal con su pareja principal durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usaron condones? (3) [FI, MC]
65. Durante los 2 meses pasados, ¿con qué frecuencia le pidió a su novio o novia que usarán condón? (7) [FI, MC]

66. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
La última vez que tuvo relaciones sexuales con su pareja principal, ¿usaron usted o su pareja un condón?	Desde el último programa/contacto, la ocasión más reciente en que sostuvo relaciones sexuales con su pareja principal, ¿usaron usted o su pareja un condón?

(10) [S/N]

67. ¿Qué tan seguido considera usted que su pareja usaría condones? (8) [FB, MC]
68. Con qué frecuencia ya usado condones al tener relaciones sexuales con sus parejas regulares durante el último mes? (8) [FI, MC]

Uso del condón con parejas/otras:

69. Durante la ocasión más reciente en la que tuvo sexo vaginal con alguien que no fuera su pareja principal, ¿usó usted condones? (3) [S/N]
70. Durante la ocasión más reciente en la que tuvo sexo anal con alguien que no fuera su pareja principal, ¿usó usted condones? (3) [S/N]
71. Para cada una de las siguientes actividades, por favor indique cuántas veces en los últimos 30 días ha realizado cada una con una mujer (excluyendo a su pareja principal): (1) [FI, MC]
- a. Coito vaginal usando un condón
 - b. Coito anal sin usar un condón
 - c. Coito anal usando un condón
 - d. Coito Vaginal sin usar un condón
72. Durante la ocasión más reciente en la que tuvo sexo anal con una mujer que no fuera su pareja principal, ¿usó usted condones? (3) [S/N]
73. Pensando en todas las veces en las que ha tenido coito anal activo o receptivo con sus parejas casuales masculinas durante los últimos 6 meses, ¿diría usted que usó un condón? (13) [MC]
74. Durante la ocasión más reciente en la que tuvo sexo anal con un hombre que no fuera su pareja principal, ¿usó usted condones? (3) [S/N]
75. Cuando tuvo relaciones sexuales con un hombre distinto a su esposo o pareja estable en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia uso esa pareja condones? (8) [FI, MC]
76. Durante la ocasión más reciente en la que tuvo sexo anal con una mujer que no fuera su pareja principal, ¿usó usted condones? (3) [S/N]

77. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
La última vez que tuvo relaciones sexuales con alguien que no fuera su pareja principal; ¿usaron usted o su pareja un condón?	Desde el último programa/contacto, la ocasión más reciente en que sostuvo relaciones sexuales con alguien que no fuera su pareja principal; ¿usaron usted o su pareja un condón?

(10) [S/N]

Uso del condón en general:

78. ¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales con una pareja que usará condones? (8) [S/N]

79. ¿Ha usado usted alguna vez condones para evitar un embarazo? (8) [S/N]

80. ¿Ha usado usted alguna vez condones para evitar contraer enfermedades? (8) [S/N]

81. Cuando sostiene relaciones sexuales, ¿qué tan seguido usa usted un condón? (7) [FI, MC]

82. Por cuánto tiempo ha venido usted usando un condón al tener relaciones sexuales? (7) [FI, MC]

83. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
¿Ha tenido sexo vaginal sin usar un condón durante los últimos 6 meses?	Desde el último programa/contacto, ha tenido sexo vaginal sin usar un condón?
¿Ha tenido sexo anal sin usar un condón durante los últimos 6 meses?	Desde el último programa/contacto, ha tenido sexo anal sin usar un condón?
¿Ha tenido alguna vez sexo oral sin usar un condón durante los últimos 6 meses?	Desde el último programa/contacto, ha tenido sexo oral sin usar un condón?

(21) [S/N]

84. Durante los dos meses pasados, ¿qué tan seguido han usado condones usted y su pareja al tener relaciones sexuales? (7) [FI, MC]
85. Durante los dos meses pasados, ¿qué porcentaje de las veces usaron condones usted y su pareja al tener relaciones sexuales? (7) [FI, MC]
86. Pensando en todas las veces en las que ha tenido relaciones sexuales vaginales o anales con una mujer durante los últimos 6 meses, ¿diría usted que usó un condón? (13) [MC]

Acceso a los condones?

87. ¿Con qué frecuencia lleva usted consigo un condón? (8) [FI, MC]
88. ¿Cómo obtuvo los condones? (8) [OE, MC]
89. Durante los 2 meses pasados, ¿qué tan seguido compró usted condones (o los obtuvo sin costo)? (7) [FI, MC]
90. Durante los 2 meses pasados, ¿qué tan seguido trajo con usted condones y los tuvo a la mano? (7) [FI, MC]

Sección para Adolescentes - Historial Sexual

Relaciones:

91. ¿En alguna ocasión ha...
platicado con una chica que le gusta, en caso de que sea hombre? (16)
[S/N]
platicado con un chico que le gusta, en caso de que sea mujer? (16)
[S/N]
92. ¿En alguna ocasión ha tenido una cita romántica? (16) [S/N]

Actividad sexual:

93. ¿En alguna ocasión ha...
besado a una chica en los labios, en caso de que sea hombre? (16) [S/N]
besado a un chico en los labios, en caso de que sea mujer? (16) [S/N]
94. ¿Alguna vez ha dado un beso de lengua (beso francés)? (16) [S/N]
95. ¿En alguna ocasión ha...
tocado los senos de una chica, en caso de que sea hombre? (16) [S/N]
le han tocado los senos, en caso de que sea mujer? (16) [S/N]
96. ¿En alguna ocasión ha...
a. tocado la vagina de una chica, en caso de que sea hombre? (16) [S/N]
b. tocado el pene de un chico, en caso de que sea mujer? (16) [S/N]
97. ¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales? (Por relaciones sexuales, queremos dar a entender la introducción del pene en la vagina.) (16) [S/N]
98. ¿Alguna vez ha tenido sexo oral? (Por sexo oral, nos referimos a que la boca de una persona toque el pene o la vagina de otra persona.) (16) [S/N]
99. ¿Ha tenido alguna vez coito anal? (Por sexo anal, nos referimos a la introducción del pene de un hombre en el ano o el recto de otra persona.) (16) [S/N]
100. Hasta el momento, he optado por no tener relaciones sexuales. (16) [S/N]
101. Si ha tenido relaciones sexuales, ¿qué edad tenía cuando sostuvo su primer encuentro sexual? (introducir un pene en una vagina) (16) [FB, MC]
102. Nunca he tenido relaciones sexuales. (16) [C/F]
103. Tenía _____ años de edad cuando sostuve mi primera relación sexual. (16) [FB, MC]

104. Si ha tenido relaciones sexuales (introducción del pene en una vagina), ¿con cuántas personas ha sido a lo largo de su vida? (16) [FI, MC]
105. ¿Con qué frecuencia tiene relaciones sexuales? (16) [FI, MC]
106. Durante los 2 meses pasados, ¿cuántas veces tuvo usted relaciones sexuales? (16) [FI, MC]
107. Durante los 2 meses pasados, ¿con cuántas personas distintas tuvo usted relaciones sexuales? (16) [FB, MC]

Sexo seguro:

108. En caso de ser hombre, ¿qué tan seguido utiliza un condón (goma) al sostener relaciones sexuales (introducción del pene en la vagina)? O, en caso de ser mujer, ¿qué tan seguido utiliza su novio un condón al tener relaciones sexuales? (16) [FI, MC]
109. ¿Usaron usted o la otra persona un condón (goma) la última vez que tuvieron relaciones sexuales? (16) [S/N]
110. Si tuvo relaciones sexuales en los últimos 2 meses, ¿cuántas veces usaron usted o su pareja un condón (goma)? (16) [FI, MC]
111. Durante los últimos 2 meses, ¿con qué frecuencia usaron usted o su(s) pareja(s) sexuales un condón al sostener relaciones sexuales? (16) [FI, MC]
112. Durante los últimos 2 meses, ¿ha utilizado usted alguno de los siguientes métodos para prevenir el embarazo? (16) [S/N]
- Condomes
 - Pastillas anticonceptivas
 - Crema o jalea espermicida
 - Esponja vaginal
 - Diafragma
 - Retiro voluntario ("sacar el miembro")
 - Relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo

Uso de Sustancias

Historial de Uso de Sustancias:

113. ¿Fuma usted cigarros? (4) [S/N]
114. ¿Alguna vez ha fumado cigarros de manera regular? (4) [S/N]
115. Durante los últimos 10 años, ¿ha ingerido alcohol hasta el punto de no recordar lo que usted hizo? (1) [S/N]
116. Para cada una de las siguientes sustancias, por favor indique si las ha consumido alguna vez o no: (1) [S/N, MC]
- a. Marihuana/Hachís
 - b. Cocaína
 - c. PCP
 - d. Alucinógenos (LSD, Mescalina, Psylocybin, MDA, STP)
 - e. Heroína
 - f. Analgésicos No Médicos (Demorol, Davoran)
 - g. Sedantes No Médicos (Barbitúricos, Metacualona, 'Depresivos')
 - h. Tranquilizantes No Médicos (Valium, Librium)
 - i. Estimulantes No Médicos (Anfetaminas, Speed, Cristal)
 - j. Metadona Ilícita
117. En comparación con etapas anteriores de su vida, ¿diría usted que consume actualmente la misma cantidad de drogas recreativas? (1) [S/N, MC]
118. ¿Alguna vez ha tomado cualquier droga callejera usando una jeringa? Lo anterior incluye la inyección intravenosa, la inyección en músculos y la inyección subcutánea. (4) [S/N]

Historial de tratamiento contra la adicción

119. ¿Ha participado alguna vez en cualquier tipo de programa de tratamiento contra la adicción? (2) [S/N]
120. En los últimos 6 meses, ¿ha participado en algún tratamiento de desintoxicación o mantenimiento con metadona, como paciente externo de un centro, o como paciente dentro de la prisión/carcel? (2) [S/N, MC]

Prácticas de compartición y limpieza de agujas:

121. ¿Cuáles son las razones por las que usted comparte agujas algunas veces? (1) [OE, MC]
122. ¿Con cuántas personas distintas ha compartido agujas en los últimos 6 meses? (1) [FI, MC]
123. ¿Cuántas personas distintas han usado una aguja antes que usted en el último mes? (19) [FI, MC]
124. ¿Cuántas veces durante el último vez ha usado alguien una aguja después de usarla usted? (19) [FI, MC]
125. ¿Cuántas veces durante el último mes ha usado usted una aguja después de que alguien la ha usado? (19) [FI, MC]
126. En los últimos 30 días, ¿usó usted la misma aguja que su pareja, ya sea que fuera o no entre uno y otro uso? (2) [S/N]
127. ¿Qué tan seguido usó agujas que estuvieran "sucias" — es decir, usadas por alguien más y no esterilizadas o desinfectadas antes de que usted las usara? (23) [FI, MC]

128. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
<p>¿En alguna ocasión ha usado usted una aguja que pudo ser empleada por alguien antes que usted, sin haberla limpiado con desinfectante y agua primero? (21) [S/N]</p>	<p>Desde el último programa/contacto, ha usado usted una aguja que pudo ser empleada por alguien antes que usted, sin haberla limpiado con desinfectante y agua primero?</p>

129. En los últimos 6 meses, se ha inyectado usted drogas al menos una vez con un equipo que alguien más usó, sin limpiarlo primero con desinfectante? (13) [S/N]

130. En los últimos 6 meses ¿compartió usted el algodón, mechero, o el agua de enjuague con otro consumidor de drogas? (13) [S/N, MC]

131. ¿cuáles son las razones por las que usted no limpia siempre sus agujas con desinfectante al compartirlas? (1) [OE, MC]

132. Qué tan seguido, durante el último mes, ha limpiado usted las agujas antes de volver a usarlas? (19) [FI, MC]

133. Antes de usar nuevamente las agujas, ¿con qué frecuencia durante el último mes utilizó usted desinfectante para limpiarlas? (19) [FI, MC]

134. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
<p>¿En alguna ocasión ha usado usted una aguja para inyectarse una droga que no le fue recetada? [S/N]</p>	<p>Desde el último programa/contacto, ¿ha usado usted una aguja para inyectarse una droga que no le fue recetada?</p>
<p>En los últimos 12 meses, ¿ha usado usted una aguja para inyectarse una droga que no le fue recetada? [S/N, MC]</p>	<p>Desde el último programa/contacto, ¿ha usado usted una aguja para inyectarse una droga que no le fue recetada?</p>
<p>La última ocasión que usó usted una aguja para inyectarse drogas, ¿de dónde obtuvo la misma? [OE, MC]</p>	<p>Desde el último programa/contacto, la última ocasión que usó usted una aguja para inyectarse drogas, ¿de dónde obtuvo la misma?</p>

La última ocasión que usó usted una aguja para inyectarse drogas, ¿se trató de una aguja nueva y no usada? (Una aguja en un empaque cerrado o con el sello intacto) [S/N]	Desde el último programa/contacto, la última ocasión que usó usted una aguja para inyectarse drogas, ¿se trató de una aguja nueva y no usada? (Una aguja en un empaque cerrado o con el sello intacto)
La última ocasión que usó usted una aguja para inyectarse drogas, ¿qué droga se inyectó? [OE, MC]	Desde el último programa/contacto, la última ocasión que usó usted una aguja para inyectarse drogas, ¿qué droga se inyectó?
La última ocasión que usó usted una aguja para inyectarse drogas, ¿conocía a alguien o sospecha que alguien la hubiera usado previamente? [S/N]	Desde el último programa/contacto, la última ocasión que usó usted una aguja para inyectarse drogas, ¿conocía a alguien o sospecha que alguien la hubiera usado previamente?
¿Ha usado usted alguna vez una aguja que sabía o sospechaba que alguien más la había usado previamente? [S/N, MC]	Desde el último programa/contacto, ¿ha usado usted una aguja que sabía o sospechaba que alguien más la había usado previamente?
¿Empleó usted desinfectante (cloro u otras soluciones) para limpiar la aguja antes de usarla? [S/N, MC]	Desde el último programa/contacto, ¿empleó usted desinfectante (cloro u otras soluciones) para limpiar la aguja antes de usarla?
La última ocasión en que usó usted una aguja para inyectarse drogas; ¿utilizó alguien más la aguja después de usted? [S/N]	Desde el último programa/contacto, la última ocasión en que usó usted una aguja para inyectarse drogas; ¿utilizó alguien más la aguja después de usted?
En los últimos 12 meses, ¿ha usted fumado, inhalado o tomado drogas que no se inyectara? [S/N, MC]	Desde el último programa/contacto, ¿ha usted fumado, inhalado o tomado drogas que no se inyectara?
La última ocasión que consumió usted drogas que no se inyectaran, ¿qué droga usó? [OE, MC]	Desde el último programa/contacto, la última ocasión que consumió usted drogas que no se inyectaran, ¿qué droga usó?

¿Cómo utilizó la droga? [OE, MC]	Desde el último programa/contacto, ¿cómo utilizó la droga?
----------------------------------	--

(10) [Por favor refiérase a las preguntas individuales para ver las opciones de respuesta]

135. ¿Ha consumido su pareja principal drogas callejeras con un aguja durante su relación? (4) [S/N, MC]
136. ¿Se ha inyectado su pareja principal con drogas como heroína, cocaína, speed, o esteroides? (5) [S/N, MC]
137. En los últimos 30 días, ¿ha compartido usted agujas con alguien que fuera seropositivo (que tuviera VIH)? (22) [S/N, MC]
138. En los últimos 30 días, ¿ha compartido usted agujas con alguien que fuera seronegativo? (22) [S/N, MC]
139. En los últimos 30 días, ¿ha compartido usted agujas con alguien cuyo status VIH desconociera? (22) [S/N, MC]

Uso de sustancias asociado a la conducta sexual:

140. ¿Cuántos de sus amigos cree usted que han tenido relaciones sexuales sin usar condón debido a que se encontraban demasiado borrachos? [FB, MC]
141. ¿Cuántos de sus amigos cree usted que han tenido relaciones sexuales sin usar condón debido a que se encontraban bajo el influjo de crack o marihuana ("yerba"/"mota")? [FB, MC]
142. ¿Ha tenido alguna vez contacto sexual con otra persona mientras se encontraba bebiendo alcohol o consumiendo otras drogas? (24) [S/N]
143. En los últimos 6 meses, ¿qué tan seguido bebió alcohol antes de tener sexo vaginal o anal con su pareja principal? (5) [FI, MC]

144. Durante la ocasión más reciente en que tuvo relaciones sexuales con su pareja principal; ¿usted o su pareja bebieron alcohol antes o durante el acto sexual? (3) [S/N, MC]
145. En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia consumió usted drogas como marihuana, crack, o heroína antes de tener relaciones sexuales vaginales o anales con su pareja principal? (5) [FI, MC]
146. Durante la ocasión más reciente en que tuvo relaciones sexuales (orales, anales o vaginales) con su pareja principal, ¿consumieron usted o su pareja drogas para ponerse en onda o intoxicarse antes del acto sexual? (3) [S/N, MC]
147. En las últimas cuatro semanas, ¿cuántas veces tuvo usted relaciones sexuales con una pareja casual mientras se encontraba bajo los efectos de drogas, tales como la marihuana, cocaína o crack? (4) [FI, MC]
148. En las últimas cuatro semanas, ¿cuántas veces tuvo usted relaciones sexuales con una pareja casual mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol? (4) [FI, MC]
149. Durante los dos meses pasados, ¿qué tan seguido consumió usted drogas o alcohol al tener relaciones sexuales? (7) [FI, MC]

150. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
La última ocasión en que tuvo relaciones sexuales, ¿usó usted una droga inyectada o alcohol? [S/N, MC]	Desde el último programa/contacto, la última ocasión en que tuvo relaciones sexuales, ¿usó usted una droga inyectada o alcohol?
La ocasión más reciente en que usó una aguja para inyectarse, ¿tuvo usted relaciones sexuales con alguien mientras estaba drogado? [S/N]	Desde el último programa/contacto, la ocasión más reciente en que usó una aguja para inyectarse, ¿tuvo usted relaciones sexuales con alguien mientras estaba drogado?
La última ocasión en que tuvo relaciones sexuales, ¿usó usted drogas no inyectadas o alcohol? [S/N, MC]	Desde el último programa/contacto, la ocasión más reciente en que tuvo relaciones sexuales, ¿usó usted drogas no inyectadas o alcohol?

(10) [Por favor refiérase a las preguntas individuales para ver las opciones de respuesta]

151. En los últimos 12 meses, ¿qué tan seguido ingirió bebidas alcohólicas antes de tener relaciones sexuales? (8) [FI, MC]
152. En caso de mantener relaciones sexuales, ¿qué tan fácil o difícil le resultaría asegurarse de que usted y su pareja usen un condón todas las veces si se encontrara bajo la influencia de alcohol o drogas? (7) [FB, S]
153. En los últimos seis meses, ¿alguna vez ha consumido usted alcohol o drogas antes de tener relaciones sexuales (vaginales o anales)? (28) [MC]
154. En los últimos seis meses, ¿con qué frecuencia ingirió alcohol antes de tener relaciones sexuales (vaginales o anales)? (28) [FI, MC]
155. En los últimos seis meses, ¿con qué frecuencia consumió usted drogas como marihuana, cocaína, speed, crack, o heroína antes de tener relaciones sexuales (vaginales o anales)? (28) [FI, MC]
156. ¿Cuántos vasos de cerveza, vino o licor se tomó durante las dos horas previas al acto sexual? (31) [FI, MC]

157. ¿Diría usted que se encontraba bajo la influencia del alcohol cuando sostuvo relaciones sexuales? (31) [S/N]
158. ¿Cuántos vasos de cerveza, vino o licor se tomó su pareja durante las dos horas previas al acto sexual? (31) [FI, MC]
159. ¿Diría usted que su pareja se encontraba bajo la influencia del alcohol cuando sostuvo relaciones sexuales? (31) [S/N]
160. ¿Consumió usted alguna droga en particular en las dos horas previas al acto sexual? (31) [S/N, MC]
161. ¿Diría usted que se encontraba bajo la influencia de esta droga cuando sostuvo relaciones sexuales? (31) [S/N]
162. ¿Consumió su pareja alguna droga en particular en las dos horas previas al acto sexual? (31) [S/N, MC]
163. ¿Diría usted que su pareja se encontraba bajo la influencia de esta droga cuando sostuvo relaciones sexuales? (31) [S/N]

Sección para Adolescentes - Consumo de Marihuana y Alcohol

Consumo de Alcohol

164. Nunca he tomado más de un pequeño sorbo de alcohol. (6) [C/F]
165. Tenía _____ años de edad la primera vez que ingerí alcohol. (6) [FB]
166. ¿Con qué frecuencia bebe? (6) [FI, MC]
167. ¿Qué tan seguido se "emborracha en serio" (Beber demasiado alcohol hasta perder el control)? (6) [FI, MC]
168. Si ha ingerido alcohol alguna vez antes de tener relaciones sexuales, ¿que tan seguido usaron usted o su pareja un condón después de beber? (6) [FI, MC]

169. En caso de mantener relaciones sexuales, ¿qué tan fácil o difícil le resultaría asegurarse de que usted y su pareja usen un condón todas las veces si se encontrara bajo la influencia de alcohol o drogas? (7) [FB, S]

Consumo de marihuana:

170. Si alguna vez ha probado la marihuana, ¿qué edad tenía la primera vez que lo hizo? (6) [FB, MC]

171. Nunca he probado la marihuana. (1) [C/F]

172. Tenía _____ años de edad la primera vez que probé la marihuana. (1) [FB]

173. ¿Con qué frecuencia consume marihuana? (6) [FB, MC]

174. ¿Qué tan seguido se pone "volado" o "realmente pacheco" con la marihuana (fumar demasiada marihuana hasta perder el control)? (6) [FI, MC]

175. Si ha fumado marihuana alguna vez antes de tener relaciones sexuales, ¿que tan seguido usaron usted o su pareja un condón después de fumarla? (6) [FI, MC]

Valoración del Riesgo

La valoración del riesgo se centra en la evaluación del riesgo personal de contraer ETS/VIH, un factor que constituye un motivador importante para el cambio conductual. Dado que las intervenciones conductuales están diseñadas para reducir las conductas *riesgosas*, un elemento crítico del cambio conductual es entender la formas en las que la gente decide si sus conductas los exponen o no a un riesgo para una condición determinada. Esta sección incluye preguntas y afirmaciones relacionadas a los factores que influyen la conducta (FIBs) con base en la propia percepción que tienen una persona del riesgo. Los FIBs asociados con la valoración del riesgo incluyen: susceptibilidad percibida, ilusión de invulnerabilidad, fatalismo, gravedad percibida, y jerarquía de problemas.



Susceptibilidad percibida

Valoración del riesgo personal de contraer ETS/VIH/SIDA:

1. ¿Cuáles piensa que son sus propias probabilidades de contagiarse de VIH/SIDA? (7) [OE, S]
2. ¿Cuál cree que es su probabilidad de contraer SIDA? (1) [OE, S]
3. ¿Cuáles considera que son sus probabilidades de contagiarse de SIDA algún día? (6) [OE, S]
4. Considerando los distintos factores que pueden contribuir a la infección de SIDA, incluyendo su conducta actual, ¿cuáles diría que son sus probabilidades de contraer SIDA en los próximos 12 meses? (4) [OE, S]
5. ¿Cuáles piensa que son las probabilidades de sus amigos de contagiarse de VIH/SIDA? (7) [OE, S]
6. ¿Cuáles cree que son las probabilidades de que contraiga una enfermedad susceptible de transmitirse con el acto sexual? (6) [OE, S]
7. ¿Hasta qué punto se siente asustado por la posibilidad de contraer VIH/SIDA? (7) [OE, S]
8. ¿Qué tan preocupado está de que pueda contagiarse de SIDA? (6) [OE, S]
9. ¿Qué tan preocupado se siente de que pueda adquirir una enfermedad de transmisión sexual? (6) [OE, S]
10. El SIDA no es mi problema realmente; es problema de alguien más. (11) [C/F]
11. El SIDA no es mi problema. (11) [C/F]
12. El SIDA no representa una amenaza para mi. (11) [C/F]

13. La crisis del SIDA ya no me aqueja a mi. (11) [C/F]
14. No soy la clase de persona que pudiera contraer SIDA. (11) [C/F]
15. No estoy en riesgo de infectarme de SIDA. (1) [C/F]
16. He escuchado suficiente acerca del SIDA, y no me interesa saber nada más. (11) [C/F]
17. La gente como yo no contrae infecciones de VIH. (30) [C/F]
18. Gozo de una excelente salud, así que mi cuerpo puede resistir y combatir una infección de VIH. (30) [C/F]
19. Soy demasiado joven para contraer una infección de VIH. (30) [C/F]
20. No me preocupa que pudiera contraer una infección de VIH. (30) [C/F]
21. La gente de mi edad es muy joven para tener una infección de VIH. (30) [C/F]
22. La gente de mi edad no se contagia de infecciones de VIH. (30) [C/F]
23. Me es indiferente la idea de contraer SIDA. (12) [C/F]
24. Tengo menos probabilidades de contraer SIDA que la mayoría de la gente. (12) [C/F]
25. El riesgo de contraer SIDA es más alto si una persona tiene muchas parejas sexuales. (4) [C/F]
26. Me preocupa con frecuencia la posibilidad de contraer SIDA. (4) [C/F]
27. El SIDA es fácil de adquirir. (11) [C/F]

Susceptibilidad percibida relacionada al uso del condón y la transmisión de ETS/VIH/SIDA:

28. Los heterosexuales que usan condones pueden reducir su riesgo de contagiarse de SIDA. (11) [C/F]
29. Si se conoce a una persona bastante bien, uno no tiene que usar condones para protegerse de que lo contagien de VIH. (7) [C/F]
30. ¿Piensa usted que los condones/gomas son sólo para hombres que tienen sexo con mujeres prostitutas? (8) [S/N]
31. ¿Qué tanto le molestaría si un condón/goma se le cayera? (8) [OE, S]
32. ¿Qué tanto le molestaría si un condón/goma se le rompiera? (8) [OE, S]
33. Si la persona con la que estuviera a punto de tener relaciones sexuales sugiriera que usáramos un condón, yo me sentiría menos preocupado. (6) [C/F]
34. Si una pareja casual usara un condón/goma, ¿piensa usted que podría contraer el virus que causa el SIDA? (8) [S/N]
35. Si una pareja casual usara un condón/goma, ¿se preocuparía usted menos acerca de contagiar a su pareja estable con una enfermedad como la sífilis, la gonorrea o el SIDA? (8) [S/N]
36. Una persona puede contagiarse del virus del SIDA incluso si él o ella tienen únicamente una sola relación sexual (introducción del pene en la vagina) sin usar condón. (6) [C/F]
37. Usted no tiene que usar un condón para protegerse del VIH si mantiene una relación con una sola persona, incluso si esa persona ha tenido antes sexo sin protección con otras gentes. (7) [C/F]
38. Es más importante usar condones en aventuras de una noche o encuentros casuales que en las relaciones estables. (7) [C/F]

39. No necesito usar un condón si mi pareja no se ve enferma. (24) [C/F]
40. No necesito usar un condón si estoy seguro de que no tengo un enfermedad. (24) [C/F]
41. Con mi vida sexual no tengo necesidad de usar condones. (4) [C/F]

Susceptibilidad percibida relacionada con la compartición de agujas y la transmisión del VIH:

42. ¿Qué tan probable es que usted se contagie de SIDA si usted comparte agujas pero no las limpia con desinfectante? (34) [S]

Susceptibilidad percibida relacionada con la homosexualidad y el VIH/SIDA:

43. Sólo las personas que son homosexuales o que consumen drogas tienen realmente que preocuparse por contraer el VIH. (7) [C/F]
44. Sólo las personas que sostienen relaciones sexuales con gente homosexual contraen el SIDA. (6) [C/F]
45. El SIDA es una enfermedad que afecta solamente a los hombres homosexuales. (4) [C/F]
46. Vivir en San Francisco aumentaría las probabilidades de cualquiera de contraer SIDA. (11) [C/F]
47. Si su novio o novia no es un consumidor de drogas, usted no tiene que preocuparse de contraer el VIH de ellos. (7) [C/F]
48. Si ama a una persona y confía en ella, y con If you love and trust someone, usted no tiene que preocuparse de contraer el VIH de ellos. (7) [C/F]

Ilusión de Invulnerabilidad

- 49. El SIDA no representa una amenaza para mi. (11) [C/F]
- 50. El SIDA no influye en mi buena disposición para participar en relaciones sexuales. (12) [C/F]
- 51. Mi estado de ánimo positivo puede evitar que yo sea infectado. (29) [C/F]
- 52. Soy demasiado saludable como para verme infectado. (29) [C/F]

Fatalismo

- 53. No hay nada que una madre que padece VIH o SIDA pueda hacer para proteger a su bebé de contraer la enfermedad. (7) [C/F]
- 54. No puede enseñarles a los niños pequeños acerca del SIDA. (11) [C/F]
- 55. El SIDA continuará propagándose aunque la gente intente prevenirlo. (4) [C/F]
- 56. No me importa si me vuelvo seropositivo. (29) [C/F]
- 57. Creo que casi todo lo que ocurre en la vida estaba destinado a suceder. (6) [C/F]
- 58. La cura para el SIDA es inminente. (11) [C/F]
- 59. Tengo muy pocas motivaciones en la vida, así que no le veo el caso a practicar el sexo seguro. (29) [C/F]
- 60. Estoy casi seguro de que voy a contraer el SIDA. (37) [MC]

Gravedad percibida

Gravedad percibida relacionada con el riesgo personal de contraer VIH/SIDA:

61. Es importante para mi evitar contagiarme de SIDA. (4) [C/F]
62. El SIDA representa un serio desafío a la idea que tenemos del sexo recreativo. (11) [C/F]
63. Siento mucho miedo cuando pienso acerca de la amenaza del SIDA. (12) [C/F]
64. Todo lo que se ha dicho sobre el SIDA me ha dejado una sensación de estrés y tensión. (12) [C/F]
65. Prefiero contraer cualquier enfermedad que no sea el SIDA. (11) [C/F]
66. El SIDA es la enfermedad más aterradorante que conozco. (37) [C/F]
67. Debido al SIDA, me siento muy nervioso para iniciar una nueva relación sexual. (12) [C/F]
68. La mayoría de la gente que es infectada por el virus del SIDA muere en un plazo de cinco años. (4) [C/F]
69. La gente que contrae SIDA casi siempre desarrolla síntomas muy dolorosos. (4) [C/F]
70. La mayoría de la gente que tiene el virus del SIDA muestra señales de la enfermedad en forma inmediata. (6) [C/F]

Gravedad percibida del SIDA como enfermedad:

- 71. Aunque el SIDA es una enfermedad mortal, es tan poco común que no representa una verdadera preocupación. (4) [C/F]
- 72. Una persona que contrae SIDA tiene buenas probabilidades de ser curada. (37) [C/F]
- 73. La gente que describe al SIDA como una epidemia está exagerando su naturaleza real. (11) [C/F]
- 74. La gente está sacando fuera de toda proporción el asunto del SIDA. (11) [C/F]
- 75. El SIDA no representa un gran problema como lo sugieren los medios. (11) [C/F]
- 76. El SIDA no es una enfermedad mortal. (4) [C/F]

Jerarquía de los problemas

- 77. Comparado con otros aspectos de su vida, ¿qué tan importante es para usted reducir sus probabilidades de contraer o propagar el SIDA? (1) [C/F]

Auto- percepciones

Las auto-percepciones comprenden los procesos internos de raciocinio que influyen la conducta de riesgo, el interés por adoptar conductas más seguras, la convicción sobre el valor que tienen esas conductas, y el sentido de capacidad para llevarlas a cabo. Un componente amplio de esta esfera se relaciona con las creencias y actitudes acerca de uno mismo. Esta sección se compone de preguntas y afirmaciones que involucran los factores que influyen las conductas (FIBs) en relación a las auto-percepciones.

Los FIBs asociados con las auto-percepciones incluyen: la auto-eficacia, la autoestima, las intenciones, los resultados esperados, la ambivalencia y los auto-estándares/identidad propia



Auto-eficacia

La auto-eficacia se relaciona con el uso del condón:

1. Me negaría a tener relaciones sexuales sin un condón. (6) [C/F]
2. Insistiría en usar un condón aún cuando mi pareja no quisiera hacerlo. (6) [C/F]
3. Sólo estoy dispuesto a tener relaciones sexuales con un condón. (1) [C/F]
4. Siento que el sexo seguro puede ser también satisfactorio para mí. (24) [C/F]
5. Siento que el sexo puede ser divertido cuando se usa un condón. (24) [C/F]
6. ¿Usaría usted un condón/goma incluso si tuviera que pararse a comprarlo o buscarlo? (9) [C/F]
7. ¿Qué tan cómodo se sentiría si su pareja principal usará un condón/goma? (8) [S]
8. ¿Qué tan cómodo(a) se sentiría si su pareja casual usará un condón/goma? (8) [S]
9. Díganos que le parecería usar condones cada vez que tenga relaciones sexuales durante los próximos dos meses. (7) [OE, S]
10. ¿Qué tan cómodo(a) se sentiría observando a su pareja ponerse un condón/goma? (8) [S]
11. ¿Qué tan cómodo(a) se sentiría poniéndole a su pareja un condón/goma? (8) [S]
12. Si tengo relaciones sexuales durante los siguientes dos meses, usar condones cada vez sería: (7) [OE, S, MC]

13. Estoy seguro que puedo usar un condón de látex con parejas nuevas. (24) [C/F]
14. ¿Qué tan seguro se siente de que podría usar un condón correctamente si su pareja lo quisiera? (16) [S]
15. Estoy seguro de que sé cómo usar un condón de látex correctamente. (24) [C/F]
16. Estoy convencido de que practicaré el sexo seguro (como usar un condón de látex) cuando esté con mi pareja regular. (24) [C/F]

Auto-eficacia relacionada con la negociación para el uso del condón:

17. ¿Sería capaz de pedirle a su pareja que usará un condón/goma si creyera que él está teniendo relaciones sexuales con alguien más? (8) [S/N, MC]
18. En caso de mantener relaciones sexuales, ¿qué tan fácil o difícil le resultaría asegurarse de que usted y su pareja usen un condón todas las veces si se encontrara bajo la influencia de alcohol o drogas? (7) [S]
19. Si tiene relaciones sexuales, ¿qué tan fácil o difícil le resultaría asegurarse de que usted y su pareja usen un condón todas las veces? (7) [S]
20. ¿Qué tan fácil o difícil le resultaría hablar sobre el uso de condones con su novio o novia? (Si no tiene un novio o una novia, por favor conteste como si lo(la) tuviera). (7) [S]
21. ¿Sería capaz de negarse a tener sexo si su pareja no quisiera usar un condón/goma? (8) [S/N]
22. ¿Qué tan seguro está de que podría convencer a su pareja para que él o ella use un condón? (16) [S]
23. ¿Sería capaz de pedirle a su pareja estable que usará un condón/goma? (8) [S/N]

24. ¿Sería capaz de pedirle a su pareja casual que usará un condón/goma? (8) [S/N]
25. Yo podría hablar con una pareja sexual acerca de usar condones de látex. (24) [C/F]
26. ¿Podría usted interrumpir un encuentro sexual si la pareja insiste en no usar un condón? (31) [S/N]

Auto-eficacia relacionada con el acceso/portación de condones:

27. ¿Qué tan fácil o difícil le resultaría obtener condones (comprarlos o conseguirlos gratis) en un lugar cercano a su casa o escuela? (7) [S]
28. ¿Qué tan cómodo se sentiría comprando un condón/goma? (8) [S]
29. ¿Qué tan fácil o difícil le resultaría traer con usted condones para tenerlos a la mano en caso de un encuentro sexual? (7) [S]
30. Durante los siguientes dos meses, traer condones conmigo sería: (7) [OE, MC, S]
31. Para mi, comprar condones o conseguirlos sin costo sería: (7) [OE, MC, S]
32. Para mi, comprar condones o conseguirlos sin costo durante los siguientes dos meses sería: (7) [OE, MC, S]
33. ¿Qué tan seguro se siente de que podría comprar condones en una farmacia? (16) [S]

Auto-eficacia relacionada con la negociación de sexo seguro/situaciones sexuales:

34. ¿Qué tan cómodo se sentiría estando desnudo enfrente de una pareja sexual? (8) [S]
35. ¿Qué tan cómodo se sentiría teniendo relaciones sexuales con las luces encendidas? (8) [S]
36. ¿Qué tan cómodo se sentiría sosteniendo relaciones sexuales con una nueva pareja? (8) [S]
37. Para mi, no tener ninguna relación sexual durante los siguientes dos meses sería: (7) [OE, MC, S]
38. ¿Qué tan fácil o difícil le resultaría decirle a su novio(a) que no va a tener sexo con él(ella)? (Si no tiene un novio o una novia, por favor conteste como si lo(la) tuviera). (7) [S]
39. ¿Qué tan seguro está de que podría hablar con su pareja casual acerca del sexo seguro? (16) [S]
40. ¿Qué tan seguro se siente de que podría negarse a tener relaciones sexuales con alguien a quien no conoce muy bien? (16) [S]
41. ¿Qué tan seguro está de que podría evitar que su pareja tuviera sexo anal con usted? (16) [S]
42. ¿Qué tan seguro se siente de que podría preguntarle a su pareja sobre sus otras parejas sexuales? (16) [S]
43. Indique ¿qué tan seguro está de que sería capaz de decir que NO a sostener relaciones sexuales con alguien a quien sólo ha conocido por unos días o MENOS? (17) [S]
44. Indique ¿qué tan seguro está de que sería capaz de decir que NO a sostener relaciones sexuales con alguien cuyo historial sexual y de consumo de drogas le es desconocido? (17) [S]

45. Indique ¿qué tan seguro está de que sería capaz de decir que NO a sostener relaciones sexuales con alguien con quien ha salido durante mucho tiempo? (17) [S]
46. Indique ¿qué tan seguro está de que sería capaz de decir que NO a sostener relaciones sexuales con alguien con quien quisiera salir nuevamente? (17) [S]
47. Indique ¿qué tan seguro está de que sería capaz de decir que NO a sostener relaciones sexuales con alguien con quien ya ha tenido sexo antes? (17) [S]
48. Indique ¿qué tan seguro está de que sería capaz de decir que NO a sostener relaciones sexuales con alguien de quien desea enamorarse? (17) [S]
49. Indique ¿qué tan seguro está de que sería capaz de decir que NO a sostener relaciones sexuales que lo está presionando para tener sexo? (17) [S]
50. Indique ¿qué tan seguro está de que sería capaz de decir que NO a sostener relaciones sexuales con alguien después de haber fumado marihuana? (17) [S]

Auto-eficacia relacionada a la discusión con la(s) pareja(s) sobre el VIH/SIDA:

51. Me sentiría incómodo hablando sobre el SIDA con una pareja potencial consumidora de drogas. (1) [C/F]

Auto-eficacia relacionada con la compartición de agujas:

52. Me sentiría incómodo no compartiendo agujas con alguien que quisiera hacerlo. (1) [C/F]
53. ¿Qué tan seguro se siente de que podría negarse a usar una aguja que ha sido utilizada previamente por un amigo? (16) [S]
54. ¿Qué tan probable ve la posibilidad de que de ahora en adelante limpiará sus agujas con desinfectante cada vez que las comparta? (34) [MC, S]

Auto-eficacia relacionada con el consumo de drogas:

55. ¿Qué tan seguro está de que podría negarse a inyectarse drogas si sus amigos le pidieran que lo hiciera con ellos? (16) [S]

Autoestima

56. Siento que soy una persona valiosa, al menos en un plano de igualdad con otros. (27) [C/F]

57. Siento que tengo un buen número de cualidades. (27) [C/F]

58. Soy capaz de hacer cosas tan bien como la mayoría de la gente. (27) [C/F]

59. Siento que no tengo mucho de lo que enorgullecerme. (27) [C/F]

60. Asumo una actitud positiva conmigo mismo. (27) [C/F]

61. En general, estoy satisfecho conmigo mismo. (27) [C/F]

62. Desearía tenerme más respeto a mi mismo. (27) [C/F]

63. En ocasiones me siento como un inútil. (27) [C/F]

64. Algunas veces pienso que no valgo nada. (27) [C/F]

Intenciones

Intenciones relacionadas con el uso del condón:

65. Sólo estoy dispuesto a tener relaciones sexuales con un condón. (1) [C/F]
66. Me negaría a tener relaciones sexuales sin un condón. (6) [C/F]
67. Insistiría en usar un condón aún cuando mi pareja no quisiera hacerlo. (6) [C/F]
68. Si tengo relaciones sexuales durante los siguientes dos meses, planeo usar condones en todas las ocasiones. (7) [C/F]
69. Si tengo relaciones sexuales durante los siguientes dos meses, planeo decirle a mi novio(a) que debemos usar condones. (7) [C/F]
70. ¿Planea usted empezar a usar condones dentro de las próximas dos semanas cuando tenga relaciones sexuales? (7) [S/N]
71. ¿Planea usted empezar a usar condones dentro de los próximos seis meses cuando tenga relaciones sexuales? (7) [S/N]
72. Durante los próximos dos meses, planeo traer condones conmigo. (7) [C/F]
73. Estoy convencido de que practicaré el sexo seguro (como usar un condón de látex) cuando esté con mi pareja regular. (24) [C/F]

Intenciones relacionadas con la actividad sexual:

74. Planeo decirle a mi novio(a) que no voy a tener sexo con él/ella durante los dos próximos meses. (7) [C/F]
75. Planeo no tener ninguna relación sexual durante los próximos dos meses. (7) [C/F]

Intenciones relacionadas con las pruebas de VIH/SIDA:

76. Si hubiera alguna prueba de sangre gratuita para detectar el virus del VIH, yo la tomaría. (11) [C/F]

Resultados Esperados

Resultados esperados relacionados con el uso del condón:

77. ¿Piensa usted que usar un condón todas las veces que tenga (sexo anal/vaginal) con su(s) (pareja principal/parejas casuales) resultaría placentero o desagradable? (34) [MC]
78. ¿Piensa usted que usar un condón todas las veces que tenga (sexo anal/vaginal) con su(s) (pareja principal/parejas casuales) sería algo inteligente o una tontería? (34) [MC]
79. ¿Piensa usted que usar un condón todas las veces que tenga (sexo anal/vaginal) con su(s) (pareja principal/parejas casuales) sería algo bueno o algo malo? (34) [MC]
80. ¿Qué tan seguro está de que al usar siempre un condón cuando tenga (sexo anal/vaginal) con su(s) (pareja principal/parejas casuales) estará protegido contra el SIDA? (34) [S]
81. ¿Qué tan probable cree que es que usted pudiera contraer el SIDA por tener (sexo anal/vaginal) con su(s) (pareja principal/parejas casuales) sin usar un condón? (34) [S]
82. Cuando quiere usted usar un condón, su novio(a) piensa que no confía en él/ella. (7) [C/F]
83. Imagine que trajera condones/gomas en su cartera, ¿cree que sus amigos hombres pensarían mal de usted? (9) [S/N]
84. Si le pidiera a su pareja estable que usara condones/gomas, ¿cree usted que se enojaría? (8) [S/N]
85. Si le pidiera a su pareja estable que usara condones/gomas, ¿cree usted que se pondría violenta? (8) [S/N]
86. ¿Se pondría violenta una pareja casual? (8) [S/N]

87. Si le pidiera a su pareja estable que usara condones/gomas, ¿cree usted que se negaría a tener relaciones sexuales? (8) [S/N]
88. ¿Se negaría a tener relaciones sexuales una pareja casual? (8) [S/N]
89. Si trajera con usted condones/gomas, ¿lo respetaría más una pareja casual que si no los trajera? (8) [S/N]
90. Si trajera con usted condones/gomas, ¿pensarían los hombres que está dispuesto a tener relaciones sexuales con alguien que acaba de conocer? (8) [S/N]
91. Le agradeceré más si no usamos un condón. (29) [C/F]
92. Quizás me rechace si yo sugiero que usemos un condón. (29) [C/F]
93. Los condones resultarían muy problemáticos para usarse. (6) [C/F]
94. Si la persona con la que estuviera a punto de tener sexo sugiriera que usáramos un condón, yo sentiría que esa persona se preocupa por mí. (6) [C/F]
95. Los condones reducen el riesgo de contraer el virus del SIDA. (Un condón es una pieza de látex que se ajusta por encima del pene.) (6) [C/F]
96. Los condones ofrecen protección contra la propagación del SIDA. (11) [C/F]
97. Los condones son un escudo protector seguro contra el SIDA. (11) [C/F]
98. El uso correcto de los condones puede reducir el riesgo de contraer SIDA. (11) [C/F]
99. Mi pareja no quiere hacer una pausa para ponerse un condón. (4) [C/F]

100. No quiero ofender a mi pareja pidiéndole a él que use un condón. (4) [C/F]
101. Yo respetaría a mi pareja si él o ella sugiriera que usáramos un condón. (6) [C/F]
102. Imagine que su pareja usara un condón/goma la próxima ocasión en que tuvieran relaciones sexuales.
- ¿Cómo se sentiría usted? (8) [OE]
 - ¿Sentiría usted menos placer sexual que si él no usara uno? (8) [OE, S/N]
103. Si su pareja usará un condón/goma, ¿duraría más el acto sexual que si no lo usara? (8) [S/N]
104. ¿Le agradaría o le disgustaría usar un condón/goma con una pareja estable? (8) [MC, S]
105. ¿Le agradaría o le disgustaría usar un condón/goma con una pareja casual? (8) [MC, S]
106. Si una pareja casual usara un condón/goma, ¿se preocuparía usted menos acerca de contagiar a su pareja estable con una enfermedad como la sífilis, la gonorrea o el SIDA? (8) [S/N]
107. Las personas que usan condones cuando tienen relaciones sexuales son gente muy responsable. (7) [C/F]

Resultados esperados relacionados con el uso del condón y la excitación sexual:

108. Usar un condón durante las relaciones sexuales me "enfriá" el momento. (1) [C/F]
109. No se sentiría tan bien al usar un condón durante las relaciones sexuales. (6) [C/F]
110. Los condones reducen el placer sexual. (4) [C/F]
111. No me gusta el sexo con condones. (7) [C/F]
112. Los condones le quitan lo divertido al sexo. (7) [C/F]
113. Los condones matan las ganas de tener sexo. (24) [C/F]
114. Con condones no se siente tan rico como al natural. (24) [C/F]
115. No me agrada la sensación del sexo con un condón. (24) [C/F]
116. Yo (o mi pareja) pierdo la erección al intentar ponerme el condón. (24) [C/F]
117. Realmente me molestaría tener que hacer una pausa durante el acto sexual para ponerme un condón. (6) [C/F]
118. ¿Piensa usted que ponerse un condón/goma interrumpiría el acto sexual? (8) [C/F]
119. ¿Sentiría usted menos placer sexual que si él no usara uno? (8) [S/N]
120. Si su pareja usará un condón/goma, ¿duraría más el acto sexual que si no lo usara? (8) [S/N]
121. ¿Cree usted que el condón/goma produciría una sensación de quemazón? (8) [S/N]

122. ¿Piensa usted que ponerse un condón/goma interrumpiría el acto sexual? (8) [S/N]
123. ¿Cree usted que el condón/goma podría caérsele? (8) [S/N]
124. ¿Piensa usted que el condón/goma podría romperse? (8) [S/N]
125. ¿Qué tanto le molestaría si un condón/goma se le cayera? (8) [S]
126. ¿Le agradaría o le disgustaría usar un condón/goma con una pareja estable? (8) [MC]
127. ¿Le agradaría o le disgustaría usar un condón/goma con una pareja casual? (8) [MC]

Resultados esperados relacionados con la desinfección de agujas

("limpiar sus obras"):

128. Utilizar cloro para limpiar las agujas es realmente muy engorroso. (1) [C/F]
129. ¿Cree usted que limpiar sus agujas con cloro, cada vez que las comparte, resultaría agradable o desagradable? (34) [MC]
130. ¿Piensa usted que limpiar sus agujas con cloro, cada vez que las comparte, sería algo inteligente o una tontería? (34) [MC]
131. ¿Cree usted que limpiar sus agujas con cloro, cada vez que las comparte, sería seguro o peligroso? (34) [MC]
132. ¿Piensa usted que limpiar sus agujas con cloro, cada vez que las comparte, sería algo bueno o algo malo que hacer? (34) [MC]
133. ¿Qué tan seguro está de que al desinfectar sus agujas con cloro cada vez que las comparte se protegerá del SIDA? (34) [S]

Ambivalencia

134. ¿Le agradaría o le desagradaría traer consigo un condón/goma? (8)
[MC, S]
135. ¿Cuales son las razones que explican porqué quizás usted no usaría condones? (4) [OE, MC]

Auto-Estándares/Identidad Propia

136. Sólo estoy dispuesto a tener relaciones sexuales con un condón. (1)
[C/F]
137. La gente como yo no contrae infecciones de VIH. (30) [C/F]
138. La gente de mi edad es muy joven para tener una infección de VIH.
(30) [C/F]
139. La gente de mi edad no se contagia de infecciones de VIH. (30) [C/F]
140. No soy la clase de persona que pudiera contraer SIDA. (11) [C/F]

Emoción y Excitación

La emoción y la excitación abordan la influencia que ejercen las emociones (felicidad, alegría, miedo, tristeza, ansiedad, etc.) sobre las conductas sexuales y el uso de sustancias. Esta sección contiene afirmaciones y preguntas que involucran los factores que influyen las conductas (FIBs) en relación a la emoción y la excitación, tales como: vergüenza y culpa y excitación sexual



Vergüenza y culpa

1. ¿Qué tanto le molestaría sentirse culpable? (8) [S, OE]
2. Si su pareja usara un condón, ¿se sentiría usted culpable? (8) [S/N]
3. Si usted usara un condón/goma, ¿se sentiría usted culpable? (9) [S/N]
4. Mi pareja se avergüenza de usar condón durante el sexo. (4) [C/F]
5. Resulta avergonzante comprar condones. (1) [C/F]
6. Me sentiría avergonzado al comprar condones. (6) [C/F]
7. La ansiedad acerca del SIDA está comenzando a afectar mis relaciones personales. (12) [C/F]

Excitación sexual

Excitación sexual:

8. No tengo control sobre mis impulsos sexuales. (37) [C/F, MC, S]
9. Una vez que me excito sexualmente, yo pierdo totalmente el control sobre lo que sucede. (37) [C/F, MC, S]

Excitación sexual relacionada al uso del condón

10. En caso de mantener relaciones sexuales, ¿qué tan fácil o difícil le resultaría asegurarse de que usted y su pareja usen un condón todas las veces si se encontrara bajo la influencia de alcohol o drogas? (7) [S]
11. Imagine que su pareja usara un condón/goma la próxima ocasión en que tuvieran relaciones sexuales. ¿cómo se sentiría usted? (8) [OE, MC]

Inquietudes acerca del estado de excitación de la pareja:

12. ¿Qué tanto le molestaría si su pareja tuviera problemas de eyaculación? (8) [S]
13. ¿Qué tanto le molestaría si su pareja tuviera problemas para mantener la erección? (8) [S]
14. ¿Piensa usted que el condón/goma lo sentiría incómodo o apretado su pareja? (8) [S/N]
15. Si su pareja usara un condón/goma, ¿resultaría más difícil para él eyacular o venirse que si no lo usara? (8) [S/N]
16. Si su pareja usara un condón/goma, ¿resultaría más difícil para él mantener una erección que si no lo usara? (8) [S/N]

Cuestiones de la relación e influencia social

Las cuestiones de la relación y la influencia social atienden al contexto interpersonal y social de las conductas de riesgo. Las conductas de riesgo relacionadas con las ETS/VIH son casi siempre interpersonales, e involucran tanto a los miembros de una pareja sexual como de una pareja consumidora de drogas. Las relaciones son interpretadas dentro de un contexto más amplio de influencia social, incluyendo las normas de grupo y las expectativas culturales.

Esta sección incluye afirmaciones y preguntas que involucran factores que influyen las conductas (FIBs) asociados con cuestiones de la relación e influencia social, tales como: comunicación y negociación, normas culturales acerca de la sexualidad y los roles por género, dinámicas interpersonales de poder, desarrollo de las relaciones, normas de grupo, presión de iguales y apoyo social.



Habilidades de Comunicación y Negociación

Discusión del VIH/SIDA:

1. A veces encuentro difícil discutir cuestiones relacionadas con el SIDA. (12) [C/F]
2. Tengo problemas para hablar sobre el SIDA con una pareja íntima. (12) [C/F]
3. Me sentiría apenado al discutir sobre el SIDA con una pareja íntima. (12) [C/F]
4. No dudaría en plantearle a una pareja sexual pasada mis inquietudes acerca del SIDA. (12) [C/F]
5. La discusión en torno al SIDA me hace sentir incómodo. (12) [C/F]

6. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
¿Qué tan seguido habla con su(s) pareja(s) sexual(es), antes de tener sexo, acerca de cómo prevenir el SIDA/VIH/ETS?	Desde el último programa/contacto, ¿qué tan seguido habla con su(s) pareja(s) sexual(es), antes de tener sexo, acerca de cómo prevenir el SIDA/VIH/ETS?

(21) [S, OE]

7. Al hablar con alguien sobre el SIDA, me siento nervioso e irascible. (12) [C/F]
8. A veces encuentro difícil discutir cuestiones relacionadas con el SIDA. (12) [C/F]
9. Los hombres y mujeres no necesitan realmente discutir sobre el SIDA entre ellos. (11) [C/F]
10. Me sentiría incómodo hablando sobre el SIDA con una pareja potencial consumidora de drogas. (1) [C/F]

Comunicación y negociación respecto al uso del condón:

11. Yo podría hablar con una pareja sexual acerca de usar condones de látex. (24) [C/F]
12. Me negaría a tener relaciones sexuales sin un condón. (6) [C/F]
13. Insistiría en usar un condón aún cuando mi pareja no quisiera hacerlo. (6) [C/F]
14. ¿Qué tan seguro está de que podría convencer a su pareja para que él o ella use un condón? (16) [S]
15. ¿Sería capaz de pedirle a su pareja estable que usará un condón/goma? (8) [S/N]
16. ¿Sería capaz de pedirle a su pareja casual que usará un condón/goma? (8) [S/N]
17. Si tenemos relaciones sexuales durante los siguientes dos meses, decirle a mi novio(a) que tenemos que usar condones sería: (7) [OE, MC, S]
18. Si tengo relaciones sexuales durante los siguientes dos meses, planeo decirle a mi novio(a) que debemos usar condones. (7) [C/F]
19. ¿Qué tan cómodo se sentiría pidiéndole a su pareja estable que usara un condón/goma? (8) [S]
20. ¿Qué tan cómodo se sentiría pidiéndole a su pareja casual que usara un condón/goma? (8) [S]
21. ¿Qué tan fácil o difícil le resultaría hablar sobre el uso de condones con su novio o novia? (Si no tiene un novio o una novia, por favor conteste como si lo(la) tuviera). (7) [S]
22. Durante los 2 meses pasados, ¿con qué frecuencia le pidió a su novio o novia que usarán condón? (7) [FI, MC]

23. Si tiene relaciones sexuales, ¿qué tan fácil o difícil le resultaría asegurarse de que usted y su pareja usen un condón todas las veces? (7) [S]
24. ¿Qué tan fácil o difícil le resultaría hablar sobre el uso de condones con su novio o novia? (Si no tiene un novio o una novia, por favor conteste como si lo(la) tuviera). (7) [S]
25. ¿Sería capaz de negarse a tener sexo si su pareja no quisiera usar un condón/goma? (8) [S/N]
26. ¿Sería capaz de pedirle a su pareja que usará un condón/goma si creyera que él está teniendo relaciones sexuales con alguien más? (8) [S/N]
27. En caso de mantener relaciones sexuales, ¿qué tan fácil o difícil le resultaría asegurarse de que usted y su pareja usen un condón todas las veces si se encontrara bajo la influencia de alcohol o drogas? (7) [S]
28. ¿Le pediría a su pareja que usara un condón/goma incluso si usted hubiera estado ingiriendo bebidas alcohólicas o consumiendo drogas?? (8) [S/N]
29. ¿Sería capaz de insistir sobre el uso del condón si su pareja no quiere usarlo? (31) [S/N]

Comunicación y negociación respecto a las relaciones sexuales

30. ¿Qué tan fácil o difícil le resultaría decirle a su novio(a) que no va a tener sexo con él(ella)? (Si no tiene un novio o una novia, por favor conteste como si lo(la) tuviera). (7) [S]

Habilidades de Comunicación y Negociación - **Sección para Adolescentes**

Discutiendo acerca de las relaciones y el sexo:

31. ¿Podría pedirle a alguien que le gusta de manera romántica que pase tiempo o salga con usted? (6) [S/N]
32. ¿Podría hablar con sus amigos acerca de alguienb que le gustaría tener como novio(a)? (6) [S/N]
33. ¿Podría hablar con sus amigos sobre el sexo? (6) [S/N]
34. ¿Podría hablar con su novio(a) sobre el sexo sin sentirse apenado(a)? (6) [S/N]
35. ¿Podría hablar con sus amigos acerca de las enfermedades que pueden contraerse al tener relaciones sexuales? (6) [S/N]
36. ¿Podría hablar de las enfermedades que se transmiten sexualmente con su novio(a)? (6) [S/N]
37. ¿Podría decirle a su novio(a) que ya no desea tener caricias con él/ella? (6) [S/N]
38. ¿Podría decirle a su novio(a) que ya no desea tener relaciones sexuales con él/ella? (6) [S/N]
39. ¿Podría decirle a su novio/novia que deje de tocarlo(a) sexualmente? (6) [S/N]

Discutiendo sobre los condones:

40. ¿Podría usted iniciar una conversación con su novio(a) acerca de los condones? (6) [S/N]
41. ¿Podría iniciar una conversación acerca de los condones con sus amigos? (6) [S/N]

Discutiendo sobre el SIDA:

42. ¿Podría hablar con sus amigos sobre el SIDA? (6) [S/N]
43. ¿Podría hablar con su novio(a) sobre el SIDA? (6) [S/N]

Discutiendo sobre asuntos sexuales, ETS y VIH/SIDA con los padres o adultos:

44. ¿Alguna vez ha hablado con sus padres o con los adultos que viven con usted sobre el sexo? (6) [S/N]
45. ¿Qué tan cómodo se siente hablando con sus padres o con los adultos que viven con usted acerca de las enfermedades que pueden contraerse por vía sexual? (6) [S]
46. ¿Alguna vez ha hablado con sus padres o con los adultos que viven con usted sobre el embarazo? (6) [S/N]
47. ¿Qué tan cómodo se siente hablando con sus padres o con los adultos que viven con usted acerca del embarazo? (6) [S]
48. ¿Alguna vez ha hablado con sus padres o con los adultos que viven con usted acerca de las enfermedades que pueden contraerse por vía sexual? (6) [S/N]
49. ¿Alguna vez ha hablado con sus padres o con los adultos que viven con usted sobre el uso de condones? (6) [S/N]
50. ¿Qué tan cómodo se siente hablando con sus padres o con los adultos que viven con usted acerca del uso de condones? (6) [S]
51. ¿Alguna vez ha hablado con sus padres o con los adultos que viven con usted sobre estos temas? (6) [S/N]
52. ¿Qué tan cómodo se siente hablando con sus padres o con los adultos que viven con usted acerca de estos temas? (6) [S]

53. ¿Alguna vez ha hablado con sus padres o con los adultos que viven con usted sobre el SIDA? (6) [S/N]
54. ¿Qué tan cómodo se siente hablando con sus padres o con los adultos que viven con usted acerca del SIDA? (6) [S]
55. ¿Alguna vez ha hablado con sus padres o con los adultos que viven con usted sobre estos temas? (6) [S/N]

Normas Culturales sobre la Sexualidad y los Roles por Género

SIDA y homosexualidad:

56. El SIDA es el castigo de Dios por la inmoralidad. (11) [C/F]
57. Los pacientes que tienen SIDA me ofenden moralmente. (11) [C/F]
58. Si no fuera por los homosexuales, no tendríamos la enfermedad del SIDA. (11) [C/F]
59. El SIDA es realmente un castigo enviado por Dios para castigar los actos pecaminosos de la homosexualidad. (11) [C/F]
60. El SIDA es el modo en que Dios puede deshacerse de los homosexuales. (11) [C/F]
61. Yo pienso que la gente que padece SIDA se lo tiene bien merecido. (24) [C/F]
62. ¿Considera usted que el sexo entre dos hombres es aceptable? (31) [S/N, OE]
63. ¿Cree usted que la homosexualidad representa un buena alternativa frente a la heterosexualidad? (31) [S/N, OE]

Condomes:

64. A mi me parece que los condones son algo malo desde un punto de vista moral. (4) [C/F]
65. Los condones son cosas artificiales. (24) [C/F]

Masturbación:

66. ¿Piensa usted que una persona puede masturbarse varias veces al día sin dañarse a si misma? (31) [S/N]
67. ¿Considera usted que la masturbación puede causar un daño físico o mental? (31) [S/N]
68. ¿Cree usted que masturbarse es una buena alternativa sexual para la gente soltera? (31) [S/N]
69. ¿Piensa usted que masturbarse es un pecado? (31) [S/N]

Roles por género:

70. ¿Cree usted que es dañino para un hombre excitarse sexualmente sin eyacular? (31) [S/N]
71. ¿Piensa usted que un hombre le demuestra menos respeto a una mujer si le habla de sexo? (31) [S/N]
72. ¿Considera usted que los hombres no pueden controlar sus deseos sexuales tan fácilmente como las mujeres? (31) [S/N]
73. ¿Piensa usted que está bien que un hombre busque variedad para su vida sexual fuera de su casa si ahí no la puede obtener? (31) [S/N]
74. ¿Cree usted que resulte peligroso para una mujer saber tanto o más de sexo que un hombre? (31) [S/N]
75. ¿Considera usted que tener experiencias sexuales antes del matrimonio es más importante para los hombres que para las mujeres? (31) [S/N]

76. ¿Piensa usted que las mujeres decentes no participan en cierto tipo de actividades sexuales? (31) [S/N]
77. ¿Cree usted que una mujer debe de pagar las consecuencias cuando coquetea con un hombre? (31) [S/N]
78. ¿Considera usted que los hombres desean tener sexo más seguido que las mujeres? (31) [S/N]
79. ¿Piensa usted que es importante para una mujer ser virgen antes del matrimonio? (31) [S/N]

Dinámicas de poder interpersonales: Coacción, sexo por drogas

Situaciones que involucran el intercambio de sexo por drogas:

80. Contacto inicial	Contacto de seguimiento
¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, drogas u hospedaje?	Desde el último programa/contacto, ¿ha tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, drogas u hospedaje?

(20) [S/N]

81. ¿Con qué frecuencia tuvo relaciones sexuales sin usar un condón de látex mientras intercambiaba, proporcionaba o recibía sexo por drogas, dinero o regalos? (23) [FI, MC]

Situaciones que involucran la coacción:

82. Me sentiría incómodo no compartiendo agujas con alguien que quisiera hacerlo. (1) [C/F]
83. ¿Puede insistir regularmente sobre el uso del condón cuando su pareja se encuentra bajo la influencia del alcohol o las drogas? (31) [S/N]

Situaciones que involucran relaciones de poder desiguales:

84. Si le pidiera a su pareja estable que usara condones/gomas, ¿cree usted que se enojaría? (8) [S/N]
85. Si le pidiera a su pareja estable que usara condones/gomas, ¿cree usted que se pondría violenta? (8) [S/N]
86. ¿Se pondría violenta una pareja casual? (8) [S/N]
87. Si le pidiera a su pareja estable que usara condones/gomas, ¿cree usted que se negaría a tener relaciones sexuales? (8) [S/N]
88. ¿Se negaría a tener relaciones sexuales una pareja casual? (8) [S/N]
89. ¿Podría usted interrumpir un encuentro sexual si la pareja insiste en no usar un condón? (31) [S/N]
90. ¿Puede seguir insistiendo sobre el uso del condón con una persona que se enoja cuando usted lo sugiere? (31) [S/N]
91. De las veces en las que tuvo sexo con un hombre durante los últimos 12 meses, ¿qué tan seguido deseaba usted tener relaciones sexuales? (31) [FI, MC]
92. De las veces en las que tuvo sexo con un hombre durante los últimos 12 meses, ¿qué tan seguido sentía usted miedo de que su pareja pudiera gritarle? (31) [FI, MC]
93. De las veces en las que tuvo sexo con un hombre durante los últimos 12 meses, ¿qué tan seguido sentía usted miedo de que su pareja pudiera pegarle? (31) [FI, MC]
94. De las veces en las que tuvo sexo con un hombre durante los últimos 12 meses, ¿qué tan seguido sentía usted miedo de que su pareja pudiera lastimarle de algún otro modo? (31) [FI, MC]

95. En su relación con su pareja principal masculina, ¿alguna vez ha... (36) [S/N]
- a. rechazado tener sexo con su pareja porque no tenía ánimos?
 - b. pedido a su pareja que esperase mientras usted conseguía un condón?
 - c. dicho a su pareja cómo tratarle sexualmente?
 - d. rehusado participar en prácticas sexuales que no le agradan?
 - e. pedido a su pareja que use un condón?
 - f. rechazado tener sexo porque su pareja no quería usar un condón?
96. ¿Quién controla (decide) si se usan o no condones cuando sostiene relaciones sexuales con su pareja principal masculina? (36) [OE, S]
97. ¿Con qué frecuencia experimenta alguna de las siguientes situaciones? (36) [S]
- a. Siento que no tengo bajo control mi vida sexual.
 - b. Siento que mi pareja controla mi vida sexual.
 - c. Siento que otras personas controlan mi vida sexual.
 - d. Yo puedo cambiar mi vida sexual si así lo deseo.
 - e. Las cosas simplemente me ocurren en mi vida sexual.
98. ¿Qué tan seguido ha sentido temor de hablar con su pareja principal masculina acerca de usar condones porque creía que él... (36) [S]
- a. ignoraría su demanda?
 - b. amenazaría con maltratarla físicamente?
 - c. abusaría verbalmente de usted?
 - d. abusaría físicamente de usted?
 - e. le abandonaría?
 - f. saldría con otras mujeres?

99. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? (36) [S]

- a. Mi pareja hace lo que quiere, incluso si yo no quiero que así sea.
- b. Me siento atrapado o atascado en nuestra relación.
- c. Estoy más comprometido con nuestra relación que mi pareja.
- d. Mi pareja me indica con quién puedo pasar el tiempo.
- e. Mi pareja siempre quiere saber dónde estoy.
- f. Mi pareja no me deja hacer ciertas cosas.
- g. La mayoría de las veces hacemos lo que mi pareja desea.
- h. Cuando mi pareja y yo estamos juntos, soy bastante callado.
- i. Mi pareja tiene más que decir que yo sobre las decisiones importantes que nos afectan.
- j. Cuando mi pareja y yo estamos en desacuerdo, él se sale con la suya casi siempre.
- k. En términos generales, mi pareja obtiene más de nuestra relación que yo.
- l. Si le pidiera a mi pareja que usara un condón, él pensaría que estoy teniendo relaciones sexuales con otras personas.
- m. Si le pidiera a mi pareja que usara un condón, él se enojaría.
- n. Si le pidiera a mi pareja que usara un condón, él se pondría violento.
- o. Mi pareja podría estar teniendo relaciones sexuales con alguien más.

100. ¿Quién tiene usualmente más que decir acerca de: (36) [S, MC, OE]

- a. lo que hacen juntos?
- b. qué tan seguido se ven?
- c. los asuntos serios sobre los que hablan?
- d. si tienen o no relaciones sexuales?
- e. qué tipo de actos sexuales practican?
- f. si usan o no condones?
- g. con qué amigos sale usted?

Desarrollo de la relación

Abordando cuestiones del sexo seguro en una relación:

101. Usted puede ser muy afectuoso con su novio(a), incluso si se abstienen de tener relaciones sexuales. (7) [C/F]
102. Si se conoce a una persona bastante bien, uno no tiene que usar condones para protegerse de que lo contagien de VIH. (7) [C/F]
103. Usted no tiene que usar un condón para protegerse del VIH si mantiene una relación con una sola persona, incluso si esa persona ha tenido antes sexo sin protección con otras gentes. (7) [C/F]
104. Es más importante usar condones en aventuras de una noche o encuentros casuales que en las relaciones estables. (7) [C/F]

Abordando el VIH/SIDA en una relación:

105. Si ama a una persona y confía en ella, usted no tiene que preocuparse de contraer el VIH de ellos. (7) [C/F]

Normas de grupo

Normas relacionadas con el sexo seguro y el uso del condón:

106. Imagine que usted trajera consigo condones/gomas en su bolsillo o bolsa. ¿Cree que sus amigas pensarían mal de usted? (8) [S/N]
107. Imagine que trajera condones/gomas en su cartera, ¿cree que sus amigos hombres pensarían mal de usted? (9) [S/N]
108. ¿Cuántas de sus amigas más cercanas cree usted que llevan consigo condones? (8) [FI, MC]
109. ¿Cuántas de sus amigas más cercanas cree usted que usan condones/gomas cuando sostienen relaciones sexuales con una pareja estable? (8) [FI, MC]

110. ¿Cuántas de sus amigas más cercanas cree usted que usan condones/gomas cuando sostienen relaciones sexuales con una pareja casual? (8) [FI, MC]
111. La mayoría de mis amigos usan condones cuando tienen sexo. (7) [C/F]
112. La mayoría de mis amigos practican el sexo seguro. (24) [C/F]
113. ¿Cuántos de sus amigos más cercanos cree usted que usan condones/gomas cuando sostienen relaciones sexuales? (6) [FI, MC]
114. ¿Cuántos de sus amigos piensan que los condones son muy problemáticos de usarse? (6) [FI, MC]
115. La mayoría de mis amigos sienten que los condones representan un gran problema o barrera durante el sexo. (24) [C/F]
116. La mayoría de mis amigos piensan que practicar el sexo seguro puede reducir su riesgo de VIH/SIDA. (24) [C/F]

Normas relacionadas con las conductas sexuales:

117. Yo tengo amigos que no planean tener relaciones sexuales hasta que sean mayores. (7) [C/F]
118. ¿Cuántos de sus amigos cree usted que hayan tenido relaciones sexuales? (6) [FI, MC]
119. Tener relaciones sexuales vuelve popular a un chico. (6) [C/F]
120. Tener relaciones sexuales vuelve popular a una chica. (6) [C/F]
121. Tener relaciones sexuales a mi edad es algo "genial" que puede hacer un chico. (6) [C/F]

122. Tener relaciones sexuales a mi edad es algo "genial" que puede hacer una chica. (6) [C/F]

123. Tener relaciones sexuales con alguien distinto a su pareja estable hace que una chica sea "genial" o popular. (6) [C/F]

124. Tener relaciones sexuales con alguien distinto a su pareja estable hace que un chico sea "genial" o popular. (6) [C/F]

Normas relacionadas al consumo de drogas y la compartición de agujas:

125. Me sentiría incómodo no compartiendo agujas con alguien que quisiera hacerlo. (1) [C/F]

126. ¿Cuántas personas que conoce limpian sus agujas con desinfectante cada vez que las comparten? (34) [FB, MC, S]

Presión de Iguales

Presión de iguales relacionada con el sexo seguro:

127. Los amigos a los que respeto piensan que yo no debería tener ninguna relación sexual durante los siguientes dos meses. (7) [C/F]

128. Mi novio(a) piensa que yo no debería tener ninguna relación sexual durante los siguientes dos meses. (7) [C/F]

129. Los amigos de mi edad a los que yo respeto piensan que yo debería decirle a mi novio(a) que no voy a tener sexo con él/ella durante los siguientes dos meses. (7) [C/F]

130. Mi novio(a) piensa que yo debería decirle que no voy a tener sexo con él/ella durante los siguientes dos meses. (7) [C/F]

131. La mayoría de mis amigos creen que yo debería tener sexo con una sola persona que no tenga otras parejas. (7) [C/F]

132. La mayoría de mis amigos creen que yo no debería tener sexo mientras me encuentre bajo la influencia del alcohol o las drogas. (7) [C/F]

133. Los amigos a los que respeto piensan que yo debería comprar condones o conseguirlos sin costo durante los siguientes dos meses. (7) [C/F]
134. Mi novio(a) piensa que yo debería comprar condones o conseguirlos sin costo durante los siguientes dos meses (7) [C/F]
135. Los amigos a los que respeto piensan que yo debería usar condones cada vez que tenga relaciones sexuales. (7) [C/F]
136. La mayoría de mis amigos creen que yo debería usar condones. (1) [C/F]
137. Los amigos a los que respeto piensan que yo debería traer conmigo condones durante los siguientes dos meses. (7) [C/F]
138. Mi novio(a) piensa que yo debería traer conmigo condones durante los siguientes dos meses. (7) [C/F]
139. Mi novio(a) piensa que yo debería usar condones cada vez que tenga relaciones sexuales durante los siguientes dos meses. (7) [C/F]

Presión de iguales relacionada al consumo de drogas y la compartición de agujas:

140. Me sentiría incómodo no compartiendo agujas con alguien que quisiera hacerlo. (1) [C/F]
141. La mayoría de mis amigos creen que yo no debería tener sexo mientras me encuentre bajo la influencia del alcohol o las drogas. (7) [C/F]
142. La mayoría de mis amigos piensan que yo no debería compartir agujas. (7) [C/F]
143. La mayoría de mis amigos creen que yo no debería usar drogas intravenosas. (7) [C/F]

Apoyo Social

El VIH/SIDA y las relaciones:

144. Algunas personas con SIDA pierden su trabajo y a sus amigos debido a que mucha gente siente temor de que puedan propagar la enfermedad. (4) [C/F]
145. La gente me evitaría si yo tuviera una infección de VIH. (30) [C/F]
146. Si yo tuviera una infección de VIH, mis amigos seguirían siendo mis amigos. (30) [C/F]

Condomes:

147. Cuando pienso que uno de mis amigos pudiera tener relaciones sexuales en una cita, yo le pregunto si trae consigo un condón. (30) [C/F]
148. Mi novio(a) piensa que yo debería comprar condones o conseguirlos sin costo durante los siguientes dos meses (7) [C/F]
149. Si yo pensara que uno de mis amigos pudiera tener relaciones sexuales en una cita, yo le preguntaría si trae consigo un condón. (30) [C/F]
150. Mis amigos y yo nos alentamos mutuamente a practicar el sexo seguro antes de las citas. (30) [C/F]

Consumo de drogas:

151. ¿Diría usted que la mayoría de las personas que le importan piensan que debería o que no debería limpiar sus agujas cada vez que las comparte? (34) [MC]

Apoyo personal:

152. ¿Aproximadamente cuántos amigos y parientes cercanos tiene usted (gente con la que se siente a gusto y con la que puede hablar sobre lo que tiene en mente)? (35) [FB, MC]
153. La gente en ocasiones busca a otras personas para tener compañía, ayuda, u otro tipo de apoyo. ¿Con qué frecuencia está disponible para usted, en caso de requerirlo, cada una de las siguientes clases de apoyo? (35) [S]
- a. Alguien que le ayude si se está confinado a una cama
 - b. Alguien en quien pueda contar para que lo escuche
 - c. Alguien que le brinde asistencia en momentos de crisis
 - d. Alguien que lo lleve al doctor en caso necesario
 - e. Alguien que le demuestre cariño y afecto
 - f. Alguien con quien pueda pasar un buen rato
 - g. Alguien que le proporcione información que le ayude a comprender una situación
 - h. Alguien en quien pueda confiar para hablar de usted o de sus problemas
 - i. Alguien a quien pueda abrazar
 - j. Alguien con quien pueda reunirse para relajarse
 - k. Alguien que le prepare sus comidas en caso de que usted no pueda hacerlo
 - l. Alguien cuya asesoría le interesa realmente
 - m. Alguien con quien pueda hacer cosas para olvidarse de sus preocupaciones
 - n. Alguien que le ayude con sus tareas diarias si usted se encuentra enfermo
 - o. Alguien con quien pueda compartir sus preocupaciones y temores más profundos
 - p. Alguien a quien pueda pedirle sugerencias para enfrentar sus problemas personales
 - q. Alguien con quien pueda disfrutar de un momento agradable
 - r. Alguien que entienda sus problemas
 - s. Alguien a quien pueda amar y hacerlo sentir querido

154. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? (36) [S, S/N]

- a. Hay una persona especial que siempre está cerca cuando la necesito
- b. Hay una persona especial con quien puedo compartir mis alegrías y tristezas
- c. Mi familia intenta realmente ayudarme
- d. Yo obtengo de mi familia la ayuda emocional que necesito
- e. Cuento con una persona especial que me conforta cuando lo requiero
- f. Mis amigos realmente procuran ayudarme
- g. Puedo contar con mis amigos cuando las cosas van mal
- h. Puedo hablar de mis problemas con mi familia
- i. Tengo amigos con quienes puedo compartir mis alegrías y tristezas
- j. Hay una persona especial en mi vida que realmente se preocupa por mis sentimientos
- k. Mi familia está dispuesta a ayudar
- l. Puedo hablar de mis problemas con mis amigos

155. Por favor responda a lo siguiente en caso de que tenga hijos. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? (36) [S, C/F]

- a. Acudo a mis hijos para que me conforten cuando me siento deprimido
- b. Cuento con mis hijos para que escuchen mis problemas
- c. Si no fuera por mis hijos yo no tendría a nadie en quien apoyarme

156. En los últimos tres meses, ¿a quién ha acudido cuando ha necesitado hablar con alguien? (36) [S/N, OE]

- a. Facilitador del Grupo
- b. Mujeres del grupo
- c. Amigas que no están dentro del grupo
- d. Su pareja principal masculina
- e. Otras parejas masculinas
- f. Miembros adultos de la familia
- g. Sus hijos
- h. Otros (especifique)

157. Durante los últimos tres meses, ¿con quién ha discutido información sobre el riesgo del VIH? (36) [S/N, OE]

- a. Pareja(s) sexual(es)
- b. Amigas
- c. Vecinos
- d. Hijos
- e. Miembros adultos de la familia
- f. Otros (especifique)
- g. Ninguno

Factores Estructurales y Ambientales

Los factores estructurales y ambientales se refieren a aspectos de las políticas públicas, las desigualdades sociales, la planeación comunitaria, la salud, etc., mismos que en su conjunto integran el contexto en el que las conductas sociales y personales tienen lugar. Las grandes estructuras sociales moldean la vida cotidiana de las personas y, al mismo tiempo, las prácticas diarias de las personas ayudan a moldear esas grandes fuerzas sociales. Esta sección contiene preguntas y afirmaciones que involucran los factores que influyen las conductas (FIBs) como resultado de factores estructurales y ambientales, tales como: barreras o facilitadores ambientales, políticas sociales, desigualdades sociales y un sentido de la comunidad.



Barreras ambientales o facilitadores

Condomes:

1. Yo sé (o mis iguales) donde se pueden conseguir condones. (24) [C/F]
2. ¿Piensa usted que resulta difícil encontrar lugares donde comprar condones/gomas? (9) [S/N]
3. Para mi, comprar condones o conseguirlos sin costo durante los siguientes dos meses sería: (7) [OE, MC, S]
4. ¿Qué tan fácil o difícil le resultaría obtener condones (comprarlos o conseguirlos gratis) en un lugar cercano a su casa o escuela? (7) [S]

VIH/SIDA:

5. Yo sé (o mis iguales) en que lugar me puedo practicar una prueba de VIH. (24) [C/F]
6. Yo sé adonde puede ir la gente con VIH o SIDA para recibir ayuda, como obtener medicamentos para el tratamiento del VIH. (24) [C/F]

Políticas Sociales

Cuestiones políticas y sociales

7. No se destina suficiente dinero a la investigación relacionada con el SIDA. (11) [C/F]
8. La gente requiere educación para aprender cómo evitar contraer el virus del SIDA. (11) [C/F]
9. El costo de la atención médica para pacientes con SIDA debe ser cubierto por el gobierno. (11) [C/F]
10. El gobierno debería ser capaz de practicar pruebas del SIDA a cualquier persona. (11) [C/F]

11. El gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir el SIDA. (11) [C/F]
12. El SIDA representa un grave problema nacional que merece atención del gobierno. (11) [C/F]
13. El SIDA podría provocar eventualmente la quiebra del sistema de salud de E.U.A. (11) [C/F]
14. Es importante mantener un sistema seguro de bancos de sangre debido al SIDA. (11) [C/F]
15. El gobierno federal debería financiar programas educativos sobre el SIDA. (11) [C/F]

Empleo:

16. La gente debería notificar a sus trabajadores en caso de contraer SIDA. (11) [C/F]
17. Los negocios deberían tener el derecho a despedir a la gente contagiada por el SIDA. (11) [C/F]
18. Los empleados tienen el derecho a saber si cualquiera de sus compañeros de trabajo padece de SIDA. (11) [C/F]
19. No debería permitirse a las personas con SIDA trabajar en escuelas públicas. (11) [C/F]
20. No debería permitirse a las personas con SIDA manejar comida en los restaurantes. (11) [C/F]

Escuelas:

21. La educación sobre el SIDA es una tarea adecuada para ser desempeñada por las escuelas. (11) [C/F]
22. La educación sexual acerca del SIDA es necesaria en la escuela. (11) [C/F]
23. Los niños infectados con SIDA deberían ser mantenidos fuera de las escuelas públicas. (11) [C/F]
24. Es importante que los estudiantes aprendan en sus clases acerca del SIDA. (11) [C/F]
25. Los niños requieren instrucción sobre el SIDA en sus programas de estudio. (11) [C/F]
26. No debería permitirse a los niños con SIDA asistir a escuelas públicas. (11) [C/F]

Atención Médica:

27. No debería permitirse a las personas con SIDA trabajar con pacientes en hospitales. (11) [C/F]
28. Las familias de las víctimas con SIDA deberían tener derecho a participar en las decisiones médicas. (11) [C/F]
29. La gente con SIDA no debería ser admitida en los hospitales. (11) [C/F]
30. Las pruebas de sangre para detectar el SIDA deberían ser administradas a todas las personas en los hospitales. (11) [C/F]
31. Los hospitales deberían tener el derecho a practicar la prueba del SIDA a todos los pacientes. (11) [C/F]
32. Un doctor con SIDA no debería estar autorizado para tratar pacientes. (11) [C/F]

33. Un empleado de hospital no debería ser obligado a trabajar con pacientes que tienen SIDA. (11) [C/F]
34. Las pruebas de sangre para detectar el SIDA deberían ser administradas a todas las personas en los hospitales. (11) [C/F]

Derechos de los Pacientes y Confidencialidad:

35. La gente que padece SIDA realmente tiene derecho a la confidencialidad sobre su enfermedad. (11) [C/F]
36. La gente debería notificar a sus trabajadores en caso de contraer SIDA. (11) [C/F]
37. Las víctimas del SIDA tienen derecho a que se salvaguarde la privacidad sobre sus vidas y estilos de vida. (11) [C/F]
38. Identificar a aquellas personas que padecen SIDA debe constituir una alta prioridad. (11) [C/F]

Desigualdades Sociales

Desigualdades en la atención médica:

39. La mayoría de la gente no puede enfrentar los costos médicos asociados al tratamiento del SIDA. (4) [C/F]
40. El alto costo del tratamiento para pacientes con SIDA resulta injusto para otras personas que demandan atención médica. (11) [C/F]
41. Los pacientes con SIDA tienen tanto derecho a recibir servicios médicos de calidad que cualquier otra persona. (11) [C/F]
42. La mayoría de la gente no puede enfrentar los costos médicos asociados al tratamiento del SIDA. (4) [C/F]

Discriminación en el centro de trabajo:

43. Algunas personas con SIDA pierden su trabajo y a sus amigos debido a que mucha gente siente temor de que puedan propagar la enfermedad. (4) [C/F]

Sentido de comunidad

44. Debido al SIDA, todos tenemos la responsabilidad de practicar conductas sexuales saludables. (11) [C/F]
45. Tenemos la obligación social de ayudar aquellos que padecen SIDA. (11) [C/F]
46. Es importante que cada persona haga lo que esté en sus manos para limitar la propagación del SIDA. (4) [C/F]

Etapas del cambio


El Modelo Transteórico, también conocido como las "Etapas del Cambio," está basado en la premisa de que el cambio conductual es un proceso que tiene lugar en una serie de etapas, y cada etapa implica haber pasado a través de la etapa previa. (Una etapa puede durar por un día o toda la vida.) Este proceso no es lineal, y con frecuencia involucra la recaída. Las cinco etapas son:

- * *Pre-reflexión* - no se piensa en un cambio
- * *Reflexión* - se piensa en un cambio pero no se practica
- * *Preparación* - se prueba un cambio
(Ej. compra de condones, se usan éstos ocasionalmente)
- * *Acción* - se realiza el cambio, aunque por menos de seis meses
- * *Mantenimiento* - el cambio se ha venido efectuando durante más de seis meses



Esta sección contiene diversos diagramas, tablas y listas de control que pueden ser usadas o modificadas para medir las etapas del cambio en los participantes de un programa.

1. **DIAGRAMA DE ETAPAS** (Conteste las preguntas y siga la línea para llegar a(al) "ETAPA")



NOTA: Para el diagrama de arriba, cualquier conducta de riesgo puede ser sustituida por la *porción en letras itálicas* de la pregunta. Por ejemplo, en lugar de la "*¿Qué tan seguido usa un condón?*" usted podría preguntar "*¿Qué tan seguido comparte agujas?*" y así sucesivamente.

2. Pregunta	PC	C	PR	A	M
Al tener relaciones sexuales, ¿qué tan seguido usó condones durante los últimos 30 días?	<input type="checkbox"/> Nunca; Casi nunca; Algunas veces; Casi siempre	<input type="checkbox"/> Nunca; Casi nunca; Algunas veces; Casi siempre	<input type="checkbox"/> Casi nunca; Algunas veces; Casi siempre	<input type="checkbox"/> Siempre	<input type="checkbox"/> Siempre
¿Por cuánto tiempo ha venido usted usando condones en todas las ocasiones?	-	-	-	<input type="checkbox"/> Menos de 6 meses	<input type="checkbox"/> 6 meses o más
¿Está considerando usted comenzar a usar condones cada vez que tenga sexo durante los próximos 6 meses?	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	-	-
¿Está planeando usted comenzar a usar condones cada vez que tenga sexo durante los próximos 30 días?	-	<input type="checkbox"/> No	-	<input type="checkbox"/> Si	-

PR=Pre-reflexión, R=Reflexión, PR=Preparación, A=Acción, M=Mantenimiento (26)

NOTA: Para la tabla de arriba, cualquier conducta de riesgo podrá ser sustituida por la *porción en letras itálicas* de la pregunta. Por ejemplo, usted podría preguntar, "Al compartir agujas en los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia las limpió con desinfectante antes de que fueran reutilizadas?" o, "¿Está considerando empezar a limpiar sus agujas antes de usarlas todas las veces durante los últimos seis meses?"

3. Alcohol: Etapas del Cambio (Formulario Corto)

Elemento de la Etapa del Alcohol para bebedores no dependientes - Hombres
(Las mujeres usan 4 o más tragos seguidos)

En el último mes ¿ha usted *tomado 5 tragos o más seguidos?*
(Marque una)

1. Si, y no tengo intenciones de dejar de *tomar 5 tragos o más seguidos.*
2. Si, pero quiero dejar de *tomar 5 tragos o más seguidos* durante los próximos 6 meses.
3. Si, pero pretendo dejar de *tomar 5 tragos o más seguidos* durante los próximos 30 días.
4. No, pero he *tomado 5 tragos o más seguidos* en los últimos 6 meses.
5. No, y no he *tomado 5 tragos o más seguidos* en los últimos 6 meses.
6. No, y nunca he *tomado 5 tragos o más seguidos.*

(31)

Puntaje

- 1 = Pre-reflexión
- 2 = Reflexión
- 3 = Preparación
- 4 = Acción
- 5 = Mantenimiento
- 6 = No *parranderos*

Nota: Para la lista de control que aparece arriba, cualquier conducta de riesgo podrá ser sustituida por la *porción en letras itálicas* de la pregunta y las afirmaciones de respuesta. Por ejemplo, "En el último mes *¿ha usted tenido sexo anal sin protección?*" y, "Si, y no tengo intenciones de dejar de tener sexo anal sin protección," y así sucesivamente. Asimismo, en la sección de puntaje, la 6 podría ser modificada para que el nombre indique que estos encuestados no participan en la conducta de riesgo. Para este ejemplo, con la siguiente afirmación, "No, nunca he tenido sexo anal sin protección sin usar un condón," la puntuación sería:
6 = usuarios constantes de condones.


4. El siguiente es un ejemplo de una escala visual que puede ser usada conjuntamente con una serie de preguntas por etapas:

Pre-reflexión	Reflexión	Preparación	Acción	Mantenimiento	Recaída
	 Evasión	 De 0 a 3 meses	 De 3 a 6 meses	 Más de 6 meses	
No: Rechazo	Quizás: Ambivalencia	Si, Hagámoslo: Motivado(a)	Hacerlo	Vivirlo	Comenzar de Nuevo

(32)

Conocimientos

La siguiente sección contiene afirmaciones y preguntas que pueden ser empleadas para medir el nivel de conocimientos de los participantes en un programa sobre diversos temas relacionados con el VIH/SIDA. Los temas incluidos en esta sección son: naturaleza y causa del SIDA; conocimientos relacionados con la transmisión del VIH/SIDA; conocimientos relacionados con las pruebas del SIDA y el tratamiento de la enfermedad; y conocimientos relacionados con los condones y el uso de los mismos.



Conocimientos

Naturaleza y causa del VIH/SIDA:

1. Una parte del problema del SIDA es que la gente no habla sobre el mismo. (11) [C/F]
2. El SIDA es una enfermedad causada por un virus. (4) [C/F]
3. Existe una diferencia entre tener el virus del SIDA y padecer la enfermedad del SIDA. (4) [C/F]
4. El SIDA es una enfermedad que afecta solamente a los hombres homosexuales. (4) [C/F]
5. El SIDA no es una enfermedad mortal. (4) [C/F]
6. El SIDA inutiliza el sistema natural de protección del cuerpo contra las enfermedades. (4) [C/F]
7. La gente que contrae SIDA casi siempre desarrolla síntomas muy dolorosos. (4) [C/F]
8. ¿Dónde ha obtenido usted la mayoría de la información que tienen sobre el SIDA? (1) [OE, MC]

Conocimientos relacionados con la transmisión del VIH/SIDA:

9. Hablando en términos generales, ¿qué tanto sabe usted sobre cómo prevenir el contagio del SIDA? (1) [OE, MC]
10. Cualquier persona infectada por el SIDA puede contagiar a otra durante las relaciones sexuales. (4) [C/F]
11. Una mujer embarazada con SIDA puede transmitirle el virus a su bebé. (4) [C/F]
12. El riesgo de contraer SIDA es más alto si una persona tiene muchas parejas sexuales. (4) [C/F]

13. La gente contrae el SIDA a través de transfusiones sanguíneas. (11) [C/F]
14. La gente contrae el SIDA a través del sexo. (11) [C/F]
15. El SIDA es transmitido fundamentalmente a través de las relaciones sexuales. (11) [C/F]

Conocimientos relacionados con las pruebas de detección del VIH y el tratamiento médico:

16. No existe cura conocida para el SIDA hasta el momento. (4) [C/F]
17. La cura para el SIDA será descubierta dentro de los próximos cinco años. (4) [C/F]
18. Si usted sostiene relaciones sexuales y se practica una prueba de VIH al día siguiente, la misma le indicará con seguridad si contrajo el VIH. (7) [C/F]
19. Existe una medicina que cura totalmente el SIDA. (7) [C/F]
20. Un examen de sangre permite identificar el virus del SIDA. (11) [C/F]
21. La ciencia médica dispone de una prueba para detectar si una persona tienen SIDA. (11) [C/F]
22. La prueba médica de detección del SIDA no siempre identificará a una persona recientemente infectada. (11) [C/F]
23. Existe una vacuna que previene la propagación del SIDA. (11) [C/F]
24. Existen tratamientos médicos efectivos para aquellos que padecen de SIDA. (11) [C/F]
25. Las personas con SIDA pueden ser curadas si buscan atención médica. (11) [C/F]

Conocimientos relacionados con los condones y el uso de los mismos:

26. Los condones no son efectivos para prevenir la transmisión del SIDA. (4) [C/F]
27. Los condones representan la mejor forma de protegerme a mi mismo contra el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. (1) [C/F]
28. Es necesario que los condones estén hechos de látex para que ofrezcan protección contra el SIDA. (24) [C/F]
29. Los condones no son confiables para la protección contra enfermedades. (4) [C/F]
30. Los condones no son efectivos para prevenir la transmisión del SIDA. (4) [C/F]
31. La vaselina y el aceite para bebés no deben usarse nunca con los condones. (7) [C/F]
32. Los lubricantes con base de aceite no deben usarse nunca con un condón. (24) [C/F]
33. ¿Piensa usted que la vaselina es un buen lubricante o crema para los condones/gomas? (1) [S/N]
34. Los lubricantes con base de agua como la jalea K-Y deben ser usados con los condones durante el sexo vaginal o anal. (24) [C/F]
35. Los condones pueden ser reutilizados. (24) [C/F]
36. Usted puede guardar condones en su cartera, de manera segura, durante al menos dos meses. (7) [C/F]
37. Guardar o traer condones en un lugar caluroso o cálido puede dañar su efectividad. (24) [C/F]

38. El condón debe encontrarse completamente desenrollado antes de ser colocado sobre el pene. (24) [C/F]
39. ¿Usted piensa que un condón/goma debe de estar desenrollado antes de colocarlo sobre el pene de un hombre? (6) [S/N]
40. El pene debe de estar erecto (duro) al ser colocado el condón. (24) [C/F]
41. Cuando el condón es puesto sobre un pene, debe dejarse cierto espacio en la punta del condón. (24) [C/F]
42. Para retirar el condón después de la relación sexual, agarre la punta y jálela suavemente con rapidez. (24) [C/F]
43. La razón más común de fallas en un condón es el uso incorrecto por parte del usuario. (24) [C/F]
44. Estoy seguro de que sé cómo usar un condón de látex correctamente. (24) [C/F]
45. Usar condones de látex (gomas) durante el acto sexual puede protegerlo del contagio del VIH. (7) [C/F]
46. Los condones no son efectivos para prevenir la transmisión del SIDA. (4) [C/F]
47. La ocasión más importante para usar condones con alguien es durante la primera relación sexual. (7) [C/F]

Apéndice A

Las siguientes preguntas abordan intenciones relacionadas a la forma en la que alguien buscaría discutir el tema del VIH/SIDA con una pareja. Estas preguntas han sido separadas del resto de las preguntas en el BP debido a que no representan objetivos comunes de las intervenciones de VIH enfocadas a las actividades de comunicación. Las respuestas a estas preguntas, sin embargo, podrían aportar información adicional sobre los participantes de un programa y ser útiles para el monitoreo de resultados en caso de que la intervención fuera a enfocarse sobre.

[Opción de respuesta: C/F]

1. Procuraría razonar con mi pareja para convencerlo(a) de discutir el tema del SIDA. (15)
2. Le dejaría entrever mi interés por discutir el tema del SIDA. (15)
3. Le diría simplemente a mi pareja que quiero discutir el tema del SIDA con él/ella. (15)
4. Pondría una cara dulce para inducir a mi pareja a discutir aspectos relacionados con el SIDA. (15)
5. Intentaría engatusar a mi pareja para convencerlo(a) de discutir el tema del SIDA. (15)
6. Procuraría reiteradamente discutir el asunto del SIDA. (15)
7. Intentaría discutir el tema del SIDA con mi pareja. (15)
8. Expondría la razón por la que considero importante para ambos hablar sobre el SIDA. (15)
9. Sacaría sutilmente a nuestra conversación el tema del SIDA. (15)

10. Explicaría con toda naturalidad porque quiero hablar sobre el SIDA. (15)
11. Demostraría sinceridad para incitar a la otra persona a hablar sobre el SIDA. (15)
12. Persuadiría a mi pareja para que discutiéramos sobre el SIDA valiéndome de algunas mentirillas piadosas. (15)
13. Insistiría en discutir el tema del SIDA, sin importar los obstáculos que pusiera mi pareja. (15)
14. Intentaría negociar los temas relacionados con el SIDA que ambos estaríamos dispuestos a discutir. (15)
15. Argumentaría de manera lógica porqué es importante que discutamos sobre el SIDA. (15)
16. Haría sugerencias para que discutiéramos sobre el SIDA. (15)
17. Le pediría simplemente a mi pareja que discutiéramos sobre el SIDA. (15)
18. Procuraría poner de buen humor a mi pareja antes de intentar hablar sobre el SIDA. (15)
19. Me valdría de engaños para convencer a mi pareja de que hablemos sobre el SIDA. (15)
20. Hablaría con mi pareja sobre el SIDA aunque él/ella no quisiera. (15)
21. Le prometería a mi pareja sexual hacer algo especial si él/ella discute el tema del SIDA conmigo. (15)
22. I would explain the reason why I want to discuss AIDS. (15)
23. Trataría de que mi pareja pensara que es él/ella quien quiere hablar acerca del SIDA. (15)

24. Le diría a mi pareja que es por el bien de él/ella que hablemos sobre el tema del SIDA. (15)
25. Me enojaría si mi pareja no quisiera discutir el tema del SIDA. (15)
26. Le haría creer a mi pareja que él/ella me estaría haciendo un favor si discutiéramos sobre el SIDA. (15)
27. Procuraría persuadir a mi pareja para que discutiéramos cuestiones relacionadas con el SIDA. (15)
28. Insistiría en discutir el tema haciéndole ver a a mi pareja lo importante que es. (15)
29. Haría que mi pareja se diera cuenta de que tengo un derecho legítimo a exigirle que hablemos sobre el SIDA. (15)
30. Procuraría lograr que mi pareja se sintiera con ganas de discutir temas relacionados con el SIDA. (15)
31. Exigiría que discutiéramos aspectos de nuestra relación que tienen que ver con el SIDA. (15)
32. Intentaría hacer que mi pareja se sintiera mal o culpable al evitar discutir sobre el SIDA conmigo. (15)
33. Hablaría en tono moralizador acerca del tema del SIDA. (15)
34. Convencería a mi pareja de discutir aspectos que traten sobre el SIDA. (15)
35. Le daría a mi pareja un fuerte abrazo para que estuviera de humor y pudiéramos discutir sobre el SIDA. (15)
36. Le diría a mi pareja lo importante que es para nosotros hablar del tema del SIDA. (15)

37. Convencería a mi pareja de que discutiéramos algunas cosas sobre el SIDA. (15)
38. Le diría a mi pareja que no tendríamos relaciones sexuales hasta que discutiéramos el tema del SIDA. (15)
39. Intentaría manipular a mi pareja que discutiéramos sobre el SIDA. (15)
40. Seguiría fastidiando a mi pareja para que habláramos sobre el tema del SIDA. (15)
41. Usaría adulaciones con mi pareja para persuadirla a discutir el tema del SIDA. (15)
42. Le diría a mi pareja que quiero hablar acerca del SIDA. (15)
43. Haría un berrinche o amenazaría con llorar si no me saliera con la mía y discutiéramos el tema del SIDA. (15)
44. Prometería recompensas sexuales si primero discutiéramos el tema del SIDA. (15)
45. Le recordaría repetidamente a mi pareja que yo deseo discutir el tema del SIDA. (15)
46. Continuaría insistiendo en discutir cuestiones del SIDA con mi pareja. (15)
47. Me volvería especialmente afectuoso(a) para que mi pareja aceptara discutir cuestiones sobre el SIDA. (15)
48. Insistiría en que mi pareja y yo habláramos sobre el SIDA. (15)
49. Le dejaría entrever sutilmente que yo quiero hablar sobre el SIDA. (15)
50. Me abstendría del contacto sexual hasta que discutiéramos el tema del SIDA. (15)

51. Porcuraría usar la coacción o el chantaje para hacer que mi pareja discutiera conmigo sobre el SIDA. (15)
52. Haría todo lo posible para convencer a mi pareja de que discutiéramos sobre el SIDA. (15)
53. Estallaría en un arranque de cólera si él/ella no quisiera discutir el tema del SIDA. (15)
54. Expondría mi necesidad de discutir sobre el SIDA con mi pareja. (15)
55. Dejaría de ser afectuoso(a) y me mostraría frío(a) hasta que él/ella estuviera dispuesto(a) a discutir conmigo el tema del SIDA. (15)
56. Le haría saber a mi pareja que nunca más le hablaría si no discutimos el tema del SIDA. (15)
57. Me enojaría y le exigiría a él/ella que platicáramos sobre el SIDA. (15)
58. Me daría por vencido(a) si mi pareja se rehusara a discutir cualquier cuestión relacionada con el SIDA. (15)
59. Le pediría a mi pareja, por el amor que me tiene, que discutiera conmigo el tema del SIDA. (15)
60. Le preguntaría a mi pareja si él/ella quiere discutir el tema del SIDA. (15)
61. Argumentaría mi postura hasta que mi pareja aceptara discutir conmigo el tema del SIDA. (15)
62. Me rehusaría a seguir relacionándome con mi pareja salvo que discutiéramos primero el tema del SIDA. (15)
63. Actuaría de manera agradable para que mi pareja no pudiera negarse a discutir conmigo el tema del SIDA. (15)

64. Convencería a mi pareja de que necesitamos discutir el tema del SIDA. (15)
65. Sería especialmente dulce, encantador(a) y agradable antes de sacar a colación el tema del SIDA. (15)
66. Le diría a mi pareja que tenemos una relación lo suficientemente estrecha como para discutir sobre el SIDA. (15)
67. Externaría en voz alta mi deseo de discutir el tema del SIDA. (15)
68. Pretendería ser un experto(a) en el tema del SIDA. (15)
69. Le suplicaría a mi pareja que habláramos sobre la enfermedad del SIDA. (15)
70. Buscaría a alguien más que me ayudara a persuadir a mi para discutir sobre el SIDA. (15)
71. Le diría a mi pareja que tengo muchos conocimientos sobre el tema del SIDA. (15)

APENDICE B

Muestras de encuestas

1) The Stereotypes About AIDS Questionnaire (SAAQ) (Cuestionario sobre los Estereotipos en torno al SIDA)

William E. Snell, Jr., SE Missouri State University

Phil Finney, SE Missouri State University

Lisa J. Godwin, SE Missouri State University

INSTRUCCIONES: Los puntos abajo listados se refieren a las creencias de la gente en torno al tema del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Nos interesa saber si usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Con tales, no hay respuestas correctas o incorrectas, solamente sus propias opiniones individuales. Para indicar sus reacciones a estas afirmaciones, utilice la siguiente escala:

A = De acuerdo.

B = Parcialmente de acuerdo.

C = Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

D = Parcialmente en desacuerdo.

E = En desacuerdo.

RECUERDE: No hay respuestas correctas o incorrectas; solamente sus propias opiniones. Asegúrese de responder a todas y cada una de las afirmaciones; no deje espacios en blanco.

1. La homosexualidad es la causa del SIDA
2. La gente que padece SIDA realmente no tiene derecho a la confidencialidad sobre su enfermedad.
3. La gente debería notificar a sus trabajadores en caso de contraer SIDA.
4. No se destina suficiente dinero a la investigación relacionada con el SIDA.
5. El SIDA puede ser transmitido al estar en el mismo cuarto con un paciente infectado.
6. La gente requiere educación para aprender cómo evitar contraer el virus del SIDA.
7. Si no fuera por los homosexuales, no tendríamos la enfermedad del SIDA.
8. Las víctimas del SIDA tienen derecho a que se salvaguarde la privacidad sobre sus vidas y estilos de vida.
9. El costo de la atención médica para pacientes con SIDA debe ser cubierto por el gobierno.
11. El SIDA puede ser transmitido al estrecharle la mano a un paciente con SIDA.
12. La educación sobre el SIDA es una tarea adecuada para ser desempeñada por las escuelas.
13. La promiscuidad sexual de los homosexuales es la razón por la que existe el SIDA.
14. El gobierno debería ser capaz de practicar pruebas del SIDA a cualquier persona.
15. Una persona puede contraer el SIDA de sus compañeros en el lugar de trabajo.
16. El gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir el SIDA.
17. El SIDA puede ser transmitido al compartir los cubiertos con un paciente infectado por el SIDA.
18. La educación sexual acerca del SIDA es necesaria en la escuela.
19. El SIDA es realmente un castigo enviado por Dios para castigar los actos pecaminosos de la homosexualidad.
20. Los niños infectados por el SIDA deben mantenerse fuera de las escuelas públicas.
21. Tener un compañero de trabajo infectado con SIDA no me molestaría.
22. El SIDA representa un grave problema nacional que merece atención del gobierno.
23. El SIDA puede transmitirse al besar a una persona infectada
24. Es importante que los estudiantes aprendan en sus clases acerca del SIDA.
25. El SIDA es el modo en que Dios puede deshacerse de los homosexuales.

26. Identificar a aquellas personas que padecen SIDA debe constituir una alta prioridad.
27. Los empleados tienen el derecho a saber si cualquiera de sus compañeros de trabajo padece de SIDA.
28. El gobierno federal debería financiar programas educativos sobre el SIDA.
29. La gente puede contagiarse de SIDA al proporcionar resucitación cardiopulmonar (CPR) a una persona infectada.
30. Los niños requieren instrucción sobre el SIDA en sus programas de estudio.

SIDA – II

INSTRUCCIONES: Los puntos abajo listados se refieren a las creencias de la gente en torno al tema del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Nos interesa saber si usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Con tales, no hay respuestas correctas o incorrectas, solamente sus propias opiniones individuales. Para indicar sus reacciones a estas afirmaciones, utilice la siguiente escala:

- A = De acuerdo.**
- B = Parcialmente de acuerdo.**
- C = Ni de acuerdo ni en desacuerdo.**
- D = Parcialmente en desacuerdo.**
- E = En desacuerdo.**

RECUERDE: No hay respuestas correctas o incorrectas; solamente sus propias opiniones. Asegúrese de responder a todas y cada una de las afirmaciones; no deje espacios en blanco.

-
1. No quiero hablar ni relacionarme con nadie que tenga SIDA.
 2. Tenemos la obligación social de ayudar aquellos que padecen SIDA.
 3. La gente que describe al SIDA como una epidemia está exagerando su naturaleza real.
 4. Como siempre, la ciencia encontrará eventualmente una cura para el SIDA.
 5. El SIDA no es mi problema realmente; es problema de alguien más.
 6. El SIDA no es mi problema.
 7. El SIDA no representa una amenaza para mí.
 8. La crisis del SIDA ya no me aqueja a mí.
 9. La gente que muere de SIDA está siendo castigada por sus errores pasados.
 10. La gente está sacando fuera de toda proporción el asunto del SIDA.
 11. La gente debe hacerse la prueba de detección del SIDA.
 12. Las personas que contraen el SIDA sólo puede culparse a sí mismas.
 13. Sólo la gente de California ha sido afectada por el SIDA.
 14. Una parte del problema del SIDA es que la gente no habla sobre el mismo.
 15. La epidemia del SIDA pronto se convertirá en un lastre financiero para la economía de E.U.A.
 16. No puede enseñarles a los niños pequeños acerca del SIDA.
 17. Los hombres y mujeres no necesitan realmente discutir sobre el SIDA entre ellos.
 18. El SIDA se ha convertido en un problema muy serio por lo que respecta a las poblaciones encarceladas.
 19. La cura para el SIDA es inminente.
 20. El SIDA es fácil de adquirir.
 21. El SIDA podría provocar eventualmente la quiebra del sistema de salud de E.U.A.
 22. No debería permitirse a la gente con SIDA trabajar en las escuelas públicas.
 23. No debería permitirse a las personas con SIDA manejar comida en los restaurantes.
 24. No debería permitirse a las personas con SIDA trabajar con pacientes en hospitales.
 25. El SIDA no representa un gran problema como lo sugieren los medios.
 26. No soy la clase de persona que pudiera contraer SIDA.
 27. Tengo menos probabilidades de contraer SIDA que la mayoría de la gente.
 28. Prefiero contraer cualquier enfermedad que no sea el SIDA.
 29. He escuchado suficiente acerca del SIDA, y no me interesa saber nada más.
 30. Vivir en San Francisco aumentaría las probabilidades de cualquiera de contraer SIDA.

31. Si estuviera disponible una prueba gratuita de sangre para detectar la presencia del virus del SIDA, yo la tomaría.
32. El SIDA es el castigo de Dios por la inmoralidad.
33. Los pacientes que tienen SIDA me ofenden moralmente.
34. Si conociera a alguien infectado con SIDA, sería difícil para mí continuar con esa relación.
35. No debería permitirse a los niños con SIDA asistir a escuelas públicas.

AIDS – III

INSTRUCCIONES: Los puntos abajo listados se refieren a las creencias de la gente en torno al tema del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Nos interesa saber si usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Con tales, no hay respuestas correctas o incorrectas, solamente sus propias opiniones individuales. Para indicar sus reacciones a estas afirmaciones, utilice la siguiente escala:

- A = De acuerdo.**
- B = Parcialmente de acuerdo.**
- C = Ni de acuerdo ni en desacuerdo.**
- D = Parcialmente en desacuerdo.**
- E = En desacuerdo.**

RECUERDE: No hay respuestas correctas o incorrectas; solamente sus propias opiniones. Asegúrese de responder a todas y cada una de las afirmaciones; no deje espacios en blanco.

-
1. Las familias de las víctimas con SIDA deberían tener derecho a participar en las decisiones médicas.
 2. La gente con SIDA no debería ser admitida en los hospitales.
 3. Los doctores pueden contagiarse de SIDA si tratan pacientes con esa enfermedad.
 4. Los pacientes con SIDA pueden contaminar al personal médico y a otros pacientes en un hospital.
 5. Es importante mantener un sistema seguro de bancos de sangre debido al SIDA.
 6. Los trabajadores de la salud pueden contraer el SIDA en situaciones médicas.
 7. La ciencia médica dispone de una prueba para detectar si una persona tiene SIDA.
 8. La prueba médica de detección del SIDA no siempre identificará a una persona recientemente infectada.
 9. Existe una vacuna que previene la propagación del SIDA.
 10. Existen tratamientos médicos efectivos para aquellos que padecen de SIDA.
 11. Los doctores y las enfermeras se encuentran en riesgo de contraer el SIDA de pacientes infectados.
 12. Ninguna persona que brinda servicios de asistencia médica ha contraído jamás el SIDA de un paciente.
 13. Las pruebas de sangre para detectar el SIDA deberían ser administradas a todas las personas en los hospitales.
 14. Los hospitales deberían tener el derecho a practicar la prueba del SIDA a todos los pacientes.
 15. Un doctor con SIDA no debería estar autorizado para tratar pacientes.
 16. Un empleado de hospital no debería ser obligado a trabajar con pacientes que tienen SIDA.
 17. Los pacientes con SIDA tienen tanto derecho a recibir servicios médicos de calidad que cualquier otra persona.
 18. El SIDA convierte los empleos médicos en ocupaciones de alto riesgo.
 19. Tratar con pacientes que tienen SIDA es distinto a tratar otro tipo de pacientes.
 20. El alto costo del tratamiento para pacientes con SIDA resulta injusto para otras personas que demandan atención médica.
 21. Trabajar con pacientes infectados por el SIDA puede ser una experiencia gratificante para el personal médico.
 22. El personal de los hospitales debe esforzarse por ser amable con los pacientes infectados por el SIDA.

23. Las personas con SIDA pueden ser curadas si buscan atención médica.
24. Para contraer el SIDA, una persona debe tener contacto sexual íntimo o contacto sanguíneo con un portador de la enfermedad.
25. La enfermedad del SIDA puede transmitirse por el intercambio de sangre (o de productos sanguíneos).
26. El SIDA ha sido identificado en hemofílicos (personas que sangran fácilmente).
27. El SIDA ha sido asociado con las transfusiones sanguíneas.
28. El SIDA se encuentra presente probablemente en la mayoría de los suministros de sangre de un país.
29. Un examen de sangre permite identificar el virus del SIDA.
30. La gente se contagia del SIDA a partir de una transfusión sanguínea.

AIDS – IV

INSTRUCCIONES: Los puntos abajo listados se refieren a las creencias de la gente en torno al tema del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Nos interesa saber si usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Con tales, no hay respuestas correctas o incorrectas, solamente sus propias opiniones individuales. Para indicar sus reacciones a estas afirmaciones, utilice la siguiente escala:

A = De acuerdo.

B = Parcialmente de acuerdo.

C = Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

D = Parcialmente en desacuerdo.

E = En desacuerdo.

RECUERDE: No hay respuestas correctas o incorrectas; solamente sus propias opiniones. Asegúrese de responder a todas y cada una de las afirmaciones; no deje espacios en blanco.

1. El SIDA representa un serio desafío a la idea que tenemos del sexo recreativo.
2. Debido al SIDA, todos tenemos la responsabilidad de practicar conductas sexuales saludables.
3. Los condones ofrecen protección contra la propagación del SIDA.
4. El SIDA no puede ser transmitido durante la actividad sexual heterosexual (hombre-mujer).
5. La gente contrae el SIDA de sus parejas sexuales.
6. Entre más parejas sexuales tenga la gente, mayores serán sus probabilidades de contagiarse de SIDA.
7. El SIDA es asociado con múltiples contactos sexuales anónimos.
8. El SIDA es transmitido mediante el contacto sexual íntimo.
9. La gente puede contraer el SIDA aunque haya tenido relaciones sexuales con una sola persona.
10. Los condones son un escudo protector seguro contra el SIDA.
11. El SIDA es esencialmente una enfermedad de transmisión sexual.
12. La gente puede contagiarse de SIDA mediante el contacto sexual con una sola persona infectada.
13. Cualquier persona sexualmente activa puede contraer el SIDA.
14. La gente contrae el SIDA a través del sexo.
15. Actualmente, la gente tienen menos relaciones sexuales debido al SIDA.
16. El SIDA es transmitido fundamentalmente a través de las relaciones sexuales.
17. El uso correcto de los condones puede reducir el riesgo de contraer SIDA.
18. El uso de condones puede prevenir la propagación del SIDA.
19. Los heterosexuales que usan condones pueden reducir su riesgo de contagiarse de SIDA.
20. La gente que tiene "aventuras de una noche" probablemente contraerá el SIDA.

Copyright – 1991

Instrucciones de Puntuación para el Cuestionario sobre los Estereotipos en torno al SIDA (SAAQ):

Finalidad

La propagación del SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) plantea una amenaza tan seria a la sociedad, razón por la cual están empezando a proliferar una variedad de estereotipos sobre la enfermedad. Snell, Finney, y Godwin (1991) llevaron a cabo una investigación para analizar diversos estereotipos acerca del SIDA. Más específicamente, ellos desarrollaron y proporcionaron una validación preliminar de las propiedades psicométricas del Cuestionario sobre los Estereotipos en torno al SIDA (SAAQ), un elemento para la medición multi-dimensional de los estereotipos sobre el SIDA. La selección de los estereotipos específicos sobre el SIDA que fueron medidos con el SAAQ se basó en una revisión bibliográfica de los estereotipos del SIDA. Cuatro categorías de estereotipos relacionados al SIDA (con múltiples sub-escalas en cada categoría) son medidas por el SAAQ: (A) creencias estereotípicas globales en torno al SIDA, (B) actitudes personales en torno al SIDA, (C) aspectos médicos en torno al SIDA, y (D) cuestiones sexuales en torno al SIDA. Los puntos que aparecen en la Sección A del Cuestionario SAAQ (Estereotipos Globales en torno al SIDA) forman 4 sub-escalas separadas que abordan los estereotipos acerca de (1) la necesidad de una educación sobre el SIDA; (2) la confidencialidad relacionada con el SIDA; (3) la transmisión del SIDA; y (4) el SIDA es causado por la homosexualidad. Los puntos que aparecen en la Sección B del Cuestionario SAAQ (Actitudes Personales en torno al SIDA) integran 5 sub-escalas separadas que tratan los estereotipos acerca (1) del deseo de evitar a aquellos que padecen SIDA; (2) el SIDA no es percibido como algo que atañe a uno mismo; (3) un enfoque cerrado respecto al SIDA (4) la cuestión de que el problema del SIDA ha sido exagerado y (5) la noción de que el SIDA representa un castigo moral. Los puntos que aparecen en la Sección C del Cuestionario SAAQ (Aspectos Médicos en torno al SIDA) conforman 4 sub-escalas separadas que tratan los estereotipos acerca (1) de la creencia de que el SIDA es una amenaza para el personal médico; (2) la protección del sistema de suministro de sangre de E.U.A. contra el SIDA; (3) la cura para el SIDA; y (4) la necesidad de que se practiquen pruebas de detección del SIDA. Los puntos que aparecen en la Sección D del Cuestionario SAAQ (Cuestiones Sexuales en torno al SIDA) forman 2 sub-escalas separadas que abordan los estereotipos acerca (1) de la relación entre el SIDA y la actividad sexual, y (2) la prevención del SIDA a través del uso de condones.

Descripción

El Cuestionario sobre los Estereotipos en torno al SIDA (SAAQ) se compone de 4 secciones. La sección A consta de 30 puntos; La sección B consta de 35 puntos; La sección C consta de 30 puntos; y la Sección D consta de 20 puntos. Al responder al cuestionario SAAQ, se les pide a los encuestados que indiquen hasta qué punto están de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación, usando un formato Likert de 5 puntos: de acuerdo (+2); parcialmente de acuerdo (+1); ni de acuerdo ni en desacuerdo (0); parcialmente en desacuerdo (-1); en desacuerdo (-2). A efecto de crear puntuaciones para las sub-escalas, los puntos en cada sub-escala son promediados. Las puntuaciones positivas (negativas) más altas corresponden a un nivel de acuerdo (desacuerdo) mayor con los estereotipos medidos por el SAAQ.

Modo de Respuesta y Control de Tiempo

La gente responde al Cuestionario sobre los Estereotipos en torno al SIDA usando una hoja de lectura por computadora para marcar (oscurecer) una respuesta (ya sea A, B, C, D o E) correspondiente a cada elemento. El cuestionario integro (Ej. las 4 secciones completas) generalmente toma de 35 a 45 minutos para ser llenado.

Puntaje

El Cuestionario SAAQ consiste de 15 sub-escalas separadas. Varios de los puntos del SAAS reciben puntuaciones revertidas (A8, A20, A21, C2, C12, Y D4) antes de que las sub-escalas sean computadas. Las 4 sub-escalas para la Sección A son: (1) la necesidad de educación sobre el SIDA (A4, A6, A12, A18, A20, A22, A24, A28, A30); (2) la confidencialidad relacionada con el SIDA (A2, A3, A8, A9, A14, A21, A26, A27); (3) la transmisión del SIDA (A5, A11, A15, A17, A23, A29); y (4) el SIDA es causado por la homosexualidad (A1, A7, A13, A19, A25). Las 5 sub-escalas para la Sección B son: (1) el deseo de evitar a aquellos que padecen SIDA (B1, B22, B23, B24, B34, B35); (2) el SIDA no es percibido como algo que atañe a uno mismo (B5, B6, B7, B8); (3) un enfoque cerrado respecto al SIDA (B13, B16, B17); (4) la cuestión de que el problema del SIDA ha sido exagerado (B3, B10, B25, B29); y (5) la noción de que el SIDA representa un castigo moral (B9, B32, B33). Las 4 sub-escalas para la Sección C son: (1) la creencia de que el SIDA constituye una amenaza para el personal médico (C3, C4, C6, C11, C12, C18); (2) la protección del sistema de suministro de sangre de E.U.A. contra el SIDA (C2, C5, C7, C17, C25, C27); (3) la cura para el SIDA (C9, C10, C23); y (4) la necesidad de que se practiquen pruebas de detección del SIDA (C13, C14). Las 2 sub-escalas para la Sección D son: (1) la relación entre el SIDA y la actividad sexual (D1, D2, D4 AL D12, D13) y (2) la prevención del SIDA a través del uso de condones (D3, D10, D17, D18, D19).

Confiabilidad

Snell, Finney, y Godwin (1991) determinaron que para la Sección A (Creencias Estereotípicas Acerca del SIDA) del Cuestionario SAAQ, los niveles de confiabilidad variaron desde .75 en un rango bajo hasta .85 en un rango alto; para la Sección B (Actitudes Personales en torno al SIDA) del Cuestionario SAAQ, los niveles de confiabilidad variaron desde .72 en un rango bajo hasta .87 en un rango alto; para la Sección C (Aspectos Médicos Relacionados con el SIDA) del Cuestionario SAAQ, los niveles de confiabilidad variaron desde .64 en un rango bajo hasta .83 en un rango alto; y que para la Sección D (La Sexualidad y el SIDA) del Cuestionario SAAQ, los coeficientes alfa de Cronbach fueron de .86 y .78, respectivamente.

Validez

Snell et al. (1991) informó que aquellos individuos aprobaron o refrendaron una amplia gama de estereotipos inexactos "negativos" sobre el SIDA, según se midió por sus respuestas al SAAQ, reportaron una mayor ansiedad relacionada con el SIDA. En particular, la gente que creyó que el SIDA no les atañía, que mostró un criterio cerrado en torno al SIDA, y que creyó que los medios estaban exagerando el problema del SIDA, indicó que sentía suficiente ansiedad por el SIDA que inhibía su actividad sexual. Adicionalmente, se encontró que aquellos que creían en la importancia de la educación sobre el SIDA reportaron que se sentirían más inclinados a emplear estrategias directas y racionales para iniciar una conversación acerca del SIDA con una pareja sexual potencial. En otra serie de hallazgos reportados por Snell et al. (1991) se trató el asunto de las reacciones estereotípicas de hombres y mujeres respecto al SIDA. Pudo descubrirse que tanto hombres como mujeres apoyaban mayores esfuerzos educativos sobre el SIDA, aunque curiosamente también se mostraron relativamente a favor de las pruebas de detección del SIDA obligatorias y generalizadas. Además, otras pruebas apuntaron a un patrón consistente de diferencias por género en cuanto a las creencias estereotípicas acerca del SIDA, sugiriendo los resultados usualmente que las mujeres expresaban actitudes más positivas y menos perjudiciales con relación al SIDA que los hombres. Snell et al. (1991) también encontró que la aprobación de diversos estereotipos socialmente indeseables por parte de las mujeres respecto a su género permitía predecir su posición de acuerdo (y de desacuerdo) con varios estereotipos perjudiciales (y no perjudiciales) acerca del SIDA y las personas que padecen SIDA, según se midió a través del SAAQ. Las mujeres que mantenían una serie de creencias menospreciativas sobre su propio género (Ej. que las mujeres son más pasivas, vulnerables y moralistas que los hombres; que las mujeres son sexualmente pasivas y provocativas) reportaron que refrendaban distintas creencias y actitudes estigmatizantes acerca del SIDA, según se midió a través del SAAQ.

9. La última ocasión que tuvo relaciones sexuales con alguien que no es su pareja principal ¿usaron usted o su pareja un condón? [1] Si [2] No [8] No recuerdo /No sé [9] Se negó	9. La última ocasión que tuvo relaciones sexuales con alguien que no es su pareja principal ¿usaron usted o su pareja un condón? [1] Si [2] No [8] No recuerdo /No sé [9] Se negó
ACTIVIDAD SEXUAL GENERAL	
10. ¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, drogas u hospedaje? [1] Si [2] No [8] No recuerdo /No sé [9] Se negó	10. Desde su última entrevista, ¿ha tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, drogas o alojamiento? [1] Si [2] No [8] No recuerdo /No sé [9] Se negó
11. ¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales con alguien que sabía o sospechaba que tenía VIH/SIDA? [1] Si [2] No [8] No sé [9] Se negó	11. Desde su última entrevista, ¿ha tenido usted relaciones sexuales con alguien que sabía o sospechaba que tenía VIH/SIDA? [1] Si [2] No [8] No sé [9] Se negó
12. ¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales con alguien que sabía o sospechaba que era usuario de drogas intravenosas? [1] Si [2] No [8] No sé [9] Se negó	12. Desde su última entrevista, ¿ha tenido usted relaciones sexuales con alguien que sabía o sospechaba que era usuario de drogas intravenosas? [1] Si [2] No [8] No sé [9] Se negó
13. La última vez que tuvo relaciones sexuales ¿consumió usted drogas intravenosas o alcohol? [1] Si [2] No [8] No puedo recordar [9] Se negó	13. La última vez que tuvo relaciones sexuales ¿consumió usted drogas intravenosas o alcohol? [1] Si [2] No [8] No puedo recordar [9] Se negó
14. La última ocasión en que tuvo relaciones sexuales, ¿usó usted drogas no inyectadas o alcohol? [1] Si [2] No [8] No puedo recordar [9] Se negó	14. La última ocasión en que tuvo relaciones sexuales, ¿usó usted drogas no inyectadas o alcohol? [1] Si [2] No [8] No puedo recordar [9] Se negó
CONDICIÓN ETS/VIH	
15. Durante los últimos 12 meses, ¿le ha dicho alguien que usted tenía una enfermedad de transmisión sexual, o ETS, por ejemplo, herpes, gonorrea, clamidia o verrugas genitales? [1] Si [2] No [8] No recuerdo /No sé [9] Se negó	15. Desde su última entrevista, ¿le ha dicho alguien que usted tenía una enfermedad de transmisión sexual, o ETS, por ejemplo, herpes, gonorrea, clamidia o verrugas genitales? [1] Si [2] No [8] No recuerdo /No sé [9] Se negó
16. ¿Alguna vez le ha dicho un doctor u otro profesional de la salud que usted se encontraba infectado por el VIH o que tenía SIDA? [1] Si [2] No [8] No recuerdo /No sé [9] Se negó	16. Desde su última entrevista, ¿alguna vez le ha dicho un doctor u otro profesional de la salud que usted se encontraba infectado por el VIH o que tenía SIDA? [1] Si [2] No [8] No recuerdo /No sé [9] Se negó

Referencia: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). *CDC Draft Outcome Monitoring Questions: Condom Use and Sexual Behavior Risks.*

Disponible en línea:

http://chipts.ucla.edu/assessment/pdf/assessments/CDC_Risk_Assessment.PDF

(Fuente 10 del BP)

3) Auto-eficacia para rehusar la conducta sexual

Descripción de la escala

Esta escala puede ser usada para acceder a habilidades de rechazo en conductas sexuales (Cecil & Pinkerton, 1998). La presente escala ha sido validada sobre un muestreo de estudiantes universitarios, predominantemente caucasicos, y la misma exhibe una consistencia interna de .85.

Puntos de la escala:

En una escala del 1 al 5, indique qué tan seguro(a) está de que sería capaz de decir que NO a tener relaciones sexuales en los siguientes casos:

1. ¿Con alguien a quien conoce desde hace algunos días o MENOS?
2. ¿Con alguien cuyo historial sexual y de consumo de drogas le es desconocido?
3. ¿Con alguien con quien ha tenido citas durante mucho tiempo?
4. ¿Con alguien con quien quisiera tener una cita nuevamente?
5. ¿Con alguien con quien ya ha tenido relaciones sexuales?
6. ¿Con alguien que quisiera que se enamorara de usted?
7. ¿Con alguien quien le está presionando para tener relaciones sexuales?
8. ¿Con alguien después de haber estado usted fumando marihuana?

FORMATO DE RESPUESTA

- 1 = Inseguro(a)
- 2 = Poco seguro(a)
- 3 = Algo seguro(A)
- 4 = Bastante seguro(a)
- 5 = Muy seguro(a)

–Fin de la escala.

Referencia: Cecil, H. & Pinkerton, S.D. (1998). Reliability and validity of a self-efficacy instrument for protective sexual behaviors. Journal of American College Health, 47, 113-121. (Fuente 17 del BP)

4) Instrumentos del CAPS

Hispanic Condom Use Study 1991 (Estudio Sobre el Uso del Condón en Hispanos de 1991) Cuestionario para ser usado con hombres

HORA AL COMENZAR: _____

Muchas de las preguntas que formularemos se relacionan con cuestiones sexuales y es posible que usted se sienta relativamente incómodo(a). Sin embargo, por favor recuerde que sus respuestas son completamente confidenciales y que usted puede indicar si hay alguna(s) pregunta(s) que no desee contestar.

Me gustaría formularle algunas preguntas generales acerca del SIDA Su respuesta puede ser "sí", "probablemente sí", "probablemente no" o "no".

1. ¿Piensa usted que es posible contraer el virus del SIDA por un piquete de mosco?
Diría usted que "sí", "probablemente sí", "probablemente no" o "no"?
1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (06)
2. ¿Piensa usted que es posible contraer el virus del SIDA al sentarse en un escusado público?
1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (07)
3. ¿Piensa usted que el SIDA es un problema sólo para homosexuales y drogadictos?
1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (08)
4. ¿Piensa usted que es posible saber por la apariencia si una persona tiene el virus del SIDA?
1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (09)
5. ¿Ha conocido usted personalmente a alguien con SIDA o que estuviera infectado con el virus del SIDA?
1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (10)
8 NO SÉ
6. ¿Qué tan seguido se preocupa de que pueda contraer el virus causante del SIDA?
¿Diría usted que muy frecuentemente, frecuentemente, algunas veces, o nunca?
(11)
1 Muy frecuentemente 2 Frecuentemente 3 Algunas veces 4 Nunca

Ahora le formularé algunas preguntas sobre los condones o gomas.

7. ¿Prefiere usted que emplee la palabra "condón" o la palabra "goma"?
4 CONDÓN 5 GOMA (12)
6 SIN PREFERENCIA (EMPLEAR "CONDÓN")

Los siguientes puntos buscan recabar información acerca de cómo son usados los condones/gomas. Aunque usted nunca haya usado condones/gomas, sus respuestas son igualmente importantes.

8. ¿Considera usted que la vaselina es un buen lubricante o crema para los condones/gomas?

1 SI 0 NO 8 NO SÉ(13)

9. ¿Piensa usted que debe desenrollarse el condón/goma antes de colocarlo sobre el pene de un hombre?

1 SI 0 NO 8 NO SÉ(14)

A continuación quisiera formularle algunas preguntas sobre sus experiencias con el uso de condones/gomas y otras actividades sexuales. Emplearé la palabra "pareja" para hacer referencia a la persona con quien uno tiene sexo. Esta información es muy importante para nuestro estudio. Cada persona tiene experiencias sexuales diferentes, de modo que algunas preguntas quizás no apliquen en su caso.

10. ¿con qué frecuencia lleva usted consigo un condón? ¿Diría usted que siempre, algunas veces, casi nunca, o nunca?

1 Siempre 2 Algunas veces 3 Casi nunca 4 Nunca (15)

11. ¿Alguna vez ha usado usted condones/gomas?

1 SI 0 NO [PROSIGA CON LA P 15] 9 RA (16)

12. ¿ha usado usted alguna vez condones para evitar un embarazo?

1 SI 0 NO 9 RA (17)

13. ¿ha usado usted alguna vez condones para evitar contraer enfermedades?

1 SI 0 NO 9 RA (18)

14. ¿Cómo obtuvo los condones?

[SI EL ENCUESTADO PROPORCIONA MÁS DE UNA RESPUESTA, PREGÚNTELE DÓNDE LOS HA COMPRADO U OBTENIDO GENERALMENTE Y ENCIERRE EN UN CÍRCULO ESA RESPUESTA SOLAMENTE]

[NO LEA LAS RESPUESTAS]

_____ LOS COMPRÓ PREGUNTE: ¿Dónde?

1 FARMACIA O BOTICA
2 MÁQUINAS EXPENDEDORAS EN BAÑOS
3 SUPERMERCADO
9 RA

(19)

_____ LE FUERON OBSEQUIADOS PREGUNTE: ¿dónde?

- 4 EN UN CENTRO DE SALUD
- 5 EN LA CALLE
- 6 POR UN AMIGO/PARIENTE
- 7 POR SU PAREJA
- 8 EN OTRO LUGAR _____
- 9 RA

15. En estas preguntas hablaremos acerca de una pareja sexual estable Una pareja sexual estable es una persona con la que uno(a) tiene sexo en una relación continua y puede ser el(la) cónyuge

Imagine que tendrá relaciones sexuales con su esposo(a) o pareja estable en los próximos 30 días. ¿Qué tan seguido cree usted que usaría condones/gomas? Diría usted que siempre, más de la mitad del tiempo, la mitad del tiempo, menos de la mitad del tiempo, o nunca?

[SI EL ENCUESTADO DICE QUE NO ES APLICABLE, DIGA: "Aunque no sepa, por favor intente hacer un cálculo."]

- 1 Siempre (20)
- 2 Más de la mitad del tiempo
- 3 La mitad del tiempo
- 4 Menos de la mitad del tiempo
- 5. Nunca
- 9 RA

16. Imagine que tendrá relaciones sexuales con una pareja que no es su pareja estable en los próximos 30. ¿Qué tan seguido cree usted que usaría condones/gomas?

[SI EL ENCUESTADO DICE QUE NO ES APLICABLE, DIGA: "Aunque no sepa, por favor intente hacer un cálculo."]

- 1 Siempre (21)
- 2 Más de la mitad del tiempo
- 3 La mitad del tiempo
- 4 Menos de la mitad del tiempo
- 5. Nunca
- 9 RA

17. ¿Ha tenido usted relaciones sexuales al menos una vez durante los últimos 12 meses, es decir, desde [ESTE MES] de 1990?

- 1 SI [PROSIGA CON LA P19] 0 NO [PROSIGA CON LA P18]
- 9 RA [PROSIGA CON LA P18] (22)

18. ¿ha tenido relaciones sexuales al menos una vez durante los últimos 5 años?

- 1 SI [PROSIGA CON LA P19] 0 NO [PROSIGA CON LA P26]
- 9 RA [PROSIGA CON LA P26] (23)

19. Como le comenté, algunas preguntas quizás no apliquen en su caso. Si la pregunta no aplica a usted, por favor hágamelo saber.

Cuando tuvo sexo con su esposa o pareja estable en los últimos 12 meses, ¿qué tan seguido usó usted condones/gomas? Diría usted que siempre, más de la mitad del tiempo, la mitad del tiempo, menos de la mitad del tiempo, o nunca?

- 1 Siempre (24)
- 2 Más de la mitad del tiempo
- 3 La mitad del tiempo
- 4 Menos de la mitad del tiempo
- 5 Nunca
- 7 SIN PAREJA ESTABLE
- 8 SIN RELACIONES SEXUALES LOS ÚLTIMOS 12 MESES
[PROSIGA CON LA P26]
- 9 RA

20. Cuando tuvo relaciones sexuales con una mujer que no fuera su esposa o su pareja estable en los últimos 12 meses, ¿qué tan seguido usó condones/gomas?

- 1 Siempre (25)
- 2 Más de la mitad del tiempo
- 3 La mitad del tiempo
- 4 Menos de la mitad del tiempo
- 5 Nunca
- 7 SIN PAREJA CASUAL
- 8 SIN PAREJA FEMENINA [PROSIGA CON LA P22]
- 9 RA

21. ¿Con cuántas mujeres en total ha tenido relaciones sexuales durante los últimos 12 meses?

___ NÚMERO DE MUJERES (26-27)
[90 O MÁS = 90] 99 RA

22. Si tuvo relaciones sexuales con cualquier pareja masculina en los últimos 12 meses, ¿qué tan seguido se usaron condones/gomas? Diría usted que siempre, más de la mitad del tiempo, la mitad del tiempo, menos de la mitad del tiempo, o nunca?

- 1 Siempre (28)
- 2 Más de la mitad del tiempo
- 3 La mitad del tiempo
- 4 Menos de la mitad del tiempo
- 5 Nunca
- 7 SIN SEXO CON LA PAREJA MASCULINA [PROSIGA CON LA P24]
- 8 SIN SEXO EN LO ABSOLUTO [PROSIGA CON LA P26]
- 9 SE NEGÓ A CONTESTAR

23. En total, ¿con cuántos hombres ha tenido sexo durante los últimos 12 meses?

___ NÚMERO DE HOMBRES (29-30)
[90 O MÁS = 90]

98 SIN SEXO EN LO ABSOLUTO [PROSIGA CON LA P26]
99 RA

SI LA P21 Y LA P23 SON 00, PROSIGA CON LA P26

24. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ingirió bebidas alcohólicas antes de tener relaciones sexuales? Diría usted que siempre, más de la mitad del tiempo, la mitad del tiempo, menos de la mitad del tiempo, o nunca?

1 Siempre (31)
2 Más de la mitad del tiempo
3 La mitad del tiempo
4 Menos de la mitad del tiempo
5 Nunca
7 SIN SEXO LOS ÚLTIMOS 12 MESES [PROSIGA CON LA P26]
9 SE NEGÓ A CONTESTAR

25. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia consumió drogas antes de tener relaciones sexuales?

1 Siempre (32)
2 Más de la mitad del tiempo
3 La mitad del tiempo
4 Menos de la mitad del tiempo
5 Nunca
9 SE NEGÓ A CONTESTAR

26. ¿Cree usted que vaya a tener relaciones sexuales en los próximos 30 días? Diría usted que ¿sí, probablemente sí, probablemente no, o no?

1 Si 2 Probablemente sí 3 Probablemente no 4 No (33)

27. Es posible que sepa usted de antemano si va a tener relaciones sexuales?

1 Si 2 Probablemente sí 3 Probablemente no 4 No (34)

En las siguientes preguntas voy a pedirle su opinión acerca del uso de condones/gomas. Si usted nunca ha tenido relaciones sexuales o jamás ha usado un condón/goma, por favor responda a las preguntas intentando imaginar lo que sentiría en cada caso.

28. ¿Piensa usted que los condones/gomas son sólo para hombres que tienen sexo con prostitutas? Diría usted que “sí”, “probablemente sí”, “probablemente no” o “no”?

1 Si 2 Probablemente sí 3 Probablemente no 4 No (35)

29. ¿Piensa usted que resulta difícil encontrar lugares donde comprar condones/gomas?

1 Si 2 Probablemente sí 3 Probablemente no 4 No (36)

30. ¿Usaría usted un condón/goma incluso si tuviera que detenerse a comprarlos o buscarlos?
 1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (37)
31. ¿Usaría usted un condón/goma incluso si hubiera estado ingiriendo bebidas alcohólicas o consumiendo drogas?
 1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (38)
- EN BLANCO (39)
33. ¿Sería capaz de rehusarse a tener relaciones sexuales si su pareja no quisiera que usted usara un condón/goma?
 1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (40)
34. Imagine que usted usará un condón/goma la próxima ocasión que tuviera relaciones sexuales.
 ¿Sentiría menor placer sexual que si no lo usara?
 1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (41)
35. Si usted usara un condón/goma, ¿duraría más el acto sexual que si no usara uno?
 1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (42)
36. Si usted usara un condón/goma, ¿se sentiría usted culpable?
 1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (43)
37. Si usted usara un condón/goma, ¿sentiría una barrera emocional con su pareja sexual?
 1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (44)
38. ¿cree usted que el condón/goma produciría una sensación de quemazón?
 1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (45)
39. ¿piensa usted que ponerse un condón/goma interrumpiría el acto sexual?
 1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (46)
40. ¿Piensa usted que la relación sexual sería más limpia que si no usara un condón/goma?
 1 Si 2 Probablemente si 3 Probablemente no 4 No (47)

****Para el resto de la encuesta, por favor visite el sitio web que aparece abajo****

Referencia: Center for AIDS Prevention Studies (CAPS). CAPS Instruments. *Hispanic Condom Use Study 1991 Questionnaire for use with Males.* Disponible en línea: <http://www.caps.ucsf.edu/projects/marinmale.html>
 (Fuente 9 del BP)

Fuentes

1. State of California, Department of Health and Human Services, Office of AIDS. *The California Survey of AIDS Knowledge, Attitudes and Behaviors: 1998*.
2. Waters J K. *The Urban Health Study, 1985-1986*.
3. National Organization for Research at the University of Chicago (NORC). Laumann E O, Michaels R T, Gagnon J H & Michaels S. *1992 National Health and Social Life Survey*.
4. Tanfer K. Battelle Memorial Institute Centers for Public Health Research and Evaluation. *National Survey of Women (1991)*.
5. Center for AIDS Prevention Studies (CAPS). *The National Sexual Health Survey*. <http://www.caps.ucsf.edu>
6. Center for AIDS Prevention Studies (CAPS). CAPS Instruments. *Healthy Oakland Teens Survey*. Disponible en línea: <http://www.caps.ucsf.edu/projects/HOTquest.html>
7. Center for HIV Intervention and Prevention (CHIP). *Teen Health Survey*. Disponible en línea: <http://psychlops.psy.uconn.edu/CHIP/MEAS2.html>
8. Center for AIDS Prevention Studies (CAPS). CAPS Instruments. *Hispanic Condom Use Study 1991 Questionnaire for use with Females*. Disponible en línea: <http://www.caps.ucsf.edu/projects/marinfemale.html>
9. Center for AIDS Prevention Studies (CAPS). CAPS Instruments. *Hispanic Condom Use Study 1991 Questionnaire for use with Males*. Disponible en línea: <http://www.caps.ucsf.edu/projects/marinmale.html>
10. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). *Evaluating CDC HIV Prevention Programs - Volume 2: Supplemental Handbook. Chapter 6: Monitoring Outcomes of HE/RR Interventions*. December 1999 (draft).

11. Snell, W. E. Finney, P. & Goodwin, L. J. *The Stereotypes About AIDS Questionnaire (SAAQ)*. Disponible en línea: <http://www4.semo.edu/snell/scales/SAAQ.htm>
12. Snell, W. E. *The Multidimensional AIDS Anxiety Questionnaire (MAAQ)*. 1996. Disponible en línea: <http://www4.semo.edu/snell/scales/MAAQ.htm>
13. Center for AIDS Prevention Studies (CAPS). *The National AIDS Behavioral Survey*. <http://www.caps.ucsf.edu>
14. Center for AIDS Prevention Studies (CAPS). *Gay Urban Men's Survey*. <http://www.caps.ucsf.edu>
15. Snell, W. E. *The AIDS Discussion Strategy Scale (ADSS)*. Disponible en línea: <http://www4.semo.edu/snell/scales/ADSS.htm>
16. Smith, K.W, M^cGraw, S.A, Costa, L.A; M^cKinlay, J.B. (1996). A self efficacy scale for HIV risk behaviors: Development and Evaluation. *AIDS Education and Prevention*, 8, 97 97-105
17. Cecil, H. & Pickerton, S.D. (1998). Reliability and Validity of self-efficacy instrument fir protective sexual behaviors. *Journal of American College Health*, 47, 113-121
18. Thirlaway K J, Fallowfield L & Cuzick J. (1996). The sexual activity questionnaire: A measure of women's sexual functioning. *Quality of Life Research* 5, 81-90.
19. Darke, S., Hall, W., Heather, N., Ward, J., & Woodak, A. (1991). The reliability of and validity of a scale to measure HIV risk taking among intravenous drug users. *AIDS* 5, 181-185
20. Gerbert, B., Bronstone A., M^cPhee, S., Pantilat S., & Allerton, M. (1998). Development and testing of an HIV- risk screening instrument for use in health care settings. *American Journal of Preventive Medicine*, 15, 103-113

21. Luther Consulting, LLC. Evaluation web.com *Baseline and Follow-up Measures for Individual, Group and PCM*. Disponible en línea: http://www.evaluationweb.com/ISDHIVGranteeInformation/Initial_and_follow_up_questions.htm Retrieved 2/15/2002
22. Wisconsin HIV Prevention Evaluation Work Group. *Wisconsin Behavioral Risk Assessment Tool (BRAT)*. Version 12/00. Disponible en línea: <http://www.hivaidsta.org/pdf/WIBRAT7-02.pdf>
23. Institute of Behavioral Research. Texas Christian University. HIV/AIDS Outreach Project. Disponible en línea: <http://www.ibr.tcu.edu/projects/aidsinte/hivaids.html> Retrieved 1/28/2002.
24. Advocates for Youth. *Training Youth to be Peer Educators. TAP Evaluation Survey: Pretest*. Disponible en línea: <http://www.advocatesforyouth.org/publications/TAP5.pdf>
25. Cancer Prevention Research Center. *HIV & Safer Sex: Stages of Change for Condom Use*. Disponible en línea: <http://www.uri.edu/research/cprc/Measures/HIVSafeSex03.htm>
26. The Measurement Group. *Evaluation of Innovative Models of HIV/AIDS Care. Module 33: Self Esteem*. Disponible en línea: <http://www.tmg-web.com/modules/module33.htm> Retrieved 4/19/02. Version of 10/26/95.
27. Center for AIDS Prevention Studies (CAPS). *National AIDS Behavioral Study (NABS)*. <http://www.caps.ucsf.edu>
28. Shah D., Thornton, S. & Burgess, P. (1997). Sexual risk cognitions questionnaire: a reliability and validity study. *AIDS Care*, 9, 471-480.
29. Lux, K. M. & Petosa, R. (1994). Preventing HIV infection among juvenile delinquents: educational diagnosis using the health belief model. *International Quarterly of Community Health Education*, 15, 145-163.

30. Center for AIDS Prevention Studies (CAPS). *Questionnaire for Unmarried Latino Women*. Disponible en línea: <http://www.caps.ucsf.edu/projects/FemEngSummerQ%207-18.doc>
Retrieved: February 11, 2003.
31. Laforge, R.G., Maddock, J. E., & Rossi, J. S. (1998). Comparison of five stage methods for alcohol abuse among college students. *Annals of Behavioral Medicine*, 20, 170 (Abstract).
32. Adapted from UCSF AIDS Health Project, 1998, *Building quality HIV prevention counseling skills: The Basic I training*. Disponible en línea: <http://www.engenderhealth.org/res/onc/hiv/preventing/miw/hiv6miw2.html>
33. Fichtner, R. *Staging Algorithm*. National Center for HIV, STD, and TB Prevention. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2001)
34. Community-level HIV intervention in 5 cities: final data from the CDC AIDS Community Demonstration Projects. *American Journal of Public Health* 1999; 89(3): 336-45. *Brief Street Intercept (BSI)*. Version: April 23, 1991.
35. The Measurement Group. *SPNS Program Cooperative Agreement Evaluation Module 46: Social Support Form*. Disponible en línea: <http://www.themeasurementgroup.com/modules/module46.htm>
36. The Women's HIV Prevention Program. 2/8/99.
37. Center for HIV Identification, Prevention and Treatment Services (CHIPTS). *Beliefs About Preventing AIDS (BAPA)*. Disponible en línea: http://chipts.ucla.edu/assessment/Assessment_Instruments/

